ТУБЕРКУЛОЗАТА У ДЕЦАТА В МИНАЛОТО И ДНЕС

Петко Минчев

*Университетска детска клиника по белодробни
болести „Св. София”, София*

Туберкулозата е моноетиологично заболяване с полиморфологични изяви. *Mycobacterium tuberculosis* е микроорганизъм с изключително сложна структура, съдържаща 50 различни протеини и изградена от 4300 гена. Няма орган от човешкото тяло, който да не боледува от туберкулоза. Същевременно с това туберкулозата е хронично по протичане и много сложно в имунологично отношение заболяване.

Всяка форма на туберкулозно заболяване е отделна нозология с обща етиология.

Туберкулозата у децата е маркер за ниво на туберкулозна ендемия в дадена страна. Този извод бе направен на първия световен форум по детска туберкулоза в Стокхолм през март 2011г., проведен под егидата на ООН, СЗО и Глобалния фонд към ООН.

Разпространението на туберкулозата сред децата в България след края на Втората световна война е изключително голямо. Общата заболеваемост от туберкулоза при възрастни 600/100 000 население, а при децата 90/100 000. При тази изключително тежка епидемиологична обстановка в страната средно годишно се разболяват приблизително 2 000 деца. Смъртността е много висока, социално икономическата ситуация е много тежка. Липсва специфична имунопрофилактика и възможности за лечение.

През 1951 г. България въвежда перорална BCG ваксина от института „Louis Pasteur”, Париж. Задължително с указ на Министерство на народното здраве и социалните грижи (МНЗСГ) децата в България се имунизират с тази ваксина. От 1957 г. в Националния център по заразни и паразитни болести - София (НЦЗПБ-София) се създава лаборатория за производство на BCG ваксина. От тогава до днес България произвежда собствена BCG ваксина.

Наред с въвеждането на задължителна BCG имунизация България е една от първите страни в света, която още през 1950 г. започва, макар и несистемно приложението на Streptomycin, Isoniazid и PAS. Създаването на национална програма и диспансерна мрежа в страната

TUBERCULOSIS IN CHILDREN IN THE PAST AND TODAY

P. Minchev

*University Pediatric Clinic of Lung Disease
„St. Sofia”*

Tuberculosis (TB) is a monoetiological disease with poly morphological expressions. *Mycobacterium tuberculosis* is a microorganism with a very complex structure, containing 50 different proteins and constructed by 4300 genes. Every organ of the human body can suffer from TB. At the same time TB runs a chronic course and is a very complicated disease in immunological terms.

Every form of TB disease is a separate nosology with a general etiology.

TB in children is a marker for the level of TB endemic in a country. This conclusion was made on the first global forum on TB in children in Stockholm in March 2011, held under the auspices of the UN, WHO and the UN Global Fund.

The spreading of tuberculosis among children in Bulgaria after the Second World War is very wide. The overall incidence of tuberculosis in adults is 600/100 000, while in children 90/100 000. In this very serious epidemic situation in the country, the average annual number of diseased children is 2000. Mortality is very high, the socio-economic situation is very difficult. There are no specific immunization prophylaxis and treatment options.

In 1951 Bulgaria introduced an oral BCG vaccine from the institute "Louis Pasteur", Paris. Required by a decree of the Ministry of Public Health and Welfare (MNZSG), children in Bulgaria are immunized with this vaccine. In 1957, the National Center of Infectious and Parasitic Diseases - Sofia (NCZPB-Sofia) created a laboratory for the production of BCG vaccine. Since then Bulgaria produces its own BCG vaccine.

Along with the introduction of compulsory BCG immunization, Bulgaria is one of the first countries in the world, which as early as 1950 began, though non-systematic, the application of Streptomycin, Isoniazid and PAS. The establishment of a national program and dispensary network created the possibility of early diagnosis and treatment of TB in children. The Royal Children Sanatorium in Tryavna, opened on March 4th 1944, still exists and operates and today the completion phase of the treatment of children with TB is performed in this medical establishment.

създават възможност за ранна диагноза и лечение на болните от туберкулоза деца. Откритият на 04.03.1944 г. Детски царски санаториум в гр. Трявна продължава да съществува и работи и довършващата фаза от лечението на болните от туберкулоза деца и днес се провежда в това лечебно заведение.

През 1956 г. към Министерството на здравеопазването се създава Централен научен изследователски институт по туберкулоза, който ръководи борбата с туберкулозата в България. През 1972 г. със създаването на Медицинска академия се създава Национален институт по пневмология и фтизиатрия, който разработва научни програми, въвежда съвременни методи на диагностика и лечение и методично ръководи борбата с туберкулозата в страната сред деца и възрастни.

Предвид създадената организация, възможностите за безплатно лечение на туберкулозно болните, контролираната специфична имунопрофилактика и санаториално лечение и диспансерен контрол туберкулозата в България бележи неимоверно снижение.

През 1990 г. заболяемостта при възрастните е в границите на 25.1/100 000 население, а при децата 8/100 000 – единадесет пъти по-ниска в сравнение с началото на периода.

След 1990 г. промените в страната доведоха до темп на нарастване на туберкулозата при деца, като през 1994 г. тя е в границите на 30/100 000. След този период заболяемостта започва бавно да се снижава, като през 2012 г. е 21/100 000 детско население.

Причините, които обуславят повишаване на заболяемостта са многобройни и не само медицински обусловени. Не особено благоприятен факт е, че в структурата на заболяемостта се проявяват всички белодробни и извънбелодробни форми на туберкулоза. Относително зачестяват проявите на туберкулозен менингоенцефалит, костно-ставна туберкулоза, очна туберкулоза, хематогенно дисеминирани форми на туберкулозно заболяване. Една от основните причини за проява на туберкулоза в ранна възраст е масивния битов контакт на фона на не висока здравна култура и липса на критерии за обхват и качество на BCG реимунизация от общопрактикуващия лекар (ОПЛ).

От изключително важно значение е ранната диагноза на туберкулозата у децата в доболничната помощ. Изработен е алгоритъм за диагноза на ниво ОПЛ, който включва:

In 1956 the Ministry of Health created the Central Research Institute of Tuberculosis, which leads the fight against TB in Bulgaria. In 1972, with the creation of the Medical Academy, the National Institute of Pneumology and Phthisiatrics is created, which develops research programs, introduces modern methods of diagnosis and treatment and methodically leads the fight against TB in the country among children and adults.

Given the established organization, the opportunities for a free treatment of TB patients, the controlled specific immunization prophylaxis and sanatorium treatment and dispensary control, TB incidences in Bulgaria decreased dramatically.

In 1990 the incidence in adults is 25.1/100 000 and in children 8/100 000 – eleven times lower than at the beginning of the period.

Since 1990, the changes in the country led to growth of the rate of TB in children, and in 1994 it was around 30/100 000. Thereafter, the incidence began slowly to descend, and in 2012 it was 21/100 000 in children.

The reasons for the increasing incidence are numerous and are not only medical. A not very favorable fact is that all forms of pulmonary and extrapulmonary TB are expressed in the structure of the disease. Manifestations of TB meningoencephalitis, bone and joint TB, ocular TB and hematogenously disseminated forms of TB are relatively frequent. One of the main reasons for the occurrence of TB at an early age are the massive social contact with low health literacy and lack of criteria for the coverage and quality of BCG reimmunization by the general practitioner (GP).

Of crucial significance is the early diagnosis of TB in children in primary care. An algorithm for the diagnosis at GP level has been designed, which includes:

- precise history
- Mantoux tuberculin skin test
- X-ray of the lungs
- CBC with differential

When there are criteria or suspicion for TB in a child, every GP can direct the child to the University Pediatric Clinic of Lung Diseases “St. Sofia” for consultation or hospitalization.

Despite the thousand-year long history of the TB disease, there is no change in the course and forms of the disease. The long-lived administration of BCG immunization prevents the haematogenous disseminations, but application faults lead to the spreading of the disease.

Unfortunately, today there is no control concerning BCG immunization, reimmunisation and the range of

- прецизна анамнеза
- туберкулинов тест на Mantoux
- рентгенография на белите дробове
- хемограма с диференциална кръвна картина

При налични критерии или съмнение за туберкулоза при дете всеки ОПЛ има възможност да насочи детето към Университетска детска клиника по белодробни болести „Св. София“ за консултация или хоспитализация. Клиниката е базирана на бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, гр. София.

Независимо от хилядолетната давност на туберкулозното заболяване няма промяна в протичането и формите на заболяването. Дълголетното приложение на BCG имунизация предотвратява хематогенните дисеминации, но пропуски в приложението водят до разпространението на заболяването.

За съжаление днес липсва контрол по отношение на имунизацията с BCG, реимунизацията и обхвата на децата, подлежащи на имунизация. Това ни лишава от възможността да определим относителния дял на заразените деца. Данните показват, че около 30% от учащите в различни възрастови групи са инфектирани с туберкулоза. Съществуващата организация на системата на здравеопазване не създава възможност за упражняване на контрол върху обхвата и качеството на имунизациите. Преди това по данните от предваксиналното изследване на туберкулиновата чувствителност при деца във възрастовите групи 7, 12 и 17 години чрез екстраполиране върху цялото детско население всяка година бе възможно да се направят изводи за инфидираност от туберкулоза сред децата. Днес това е невъзможно, защото не разполагаме с информация за състоянието на постваксиналния имунитет при децата и юношите.

Трябва да се подчертае, че деца в ранна възраст (0 - 3 г.) с хиперергична туберкулинова чувствителност (туберкулинов тест на Mantoux > 15 мм) без морфологични промени са еквивалент на болни. Тези деца се лекуват по правилата на изкуството.

Лечението на туберкулозата е дълъг и не винаги съпътстван с благоприятен край процес. Не бива да се забравя, че през последните 60 години няма създадени нови противотуберкулозни лекарства. Общоприето е, че минималният терапевтичен срок е 6 месеца. Разбира се, съществуват форми, които се лекуват от 8 до 10 или от 12 до 15 месеца. Това правило е валидно за целия свят и е продиктувано от спецификата на етиологичния

children undergoing immunization. This deprives us of the opportunity to determine the proportion of infected children. The data indicate that about 30% of students in various age groups are infected with TB. The existing organization of the health care system does not create the possibility to exercise control over the scope and quality of immunizations. Previously, from data from the pre-vaccination study for tuberculin sensitivity in children in the age groups 7, 12 and 17 years by extrapolating the entire child population for each year, it was possible to draw conclusions about the TB rate in children. Today this is impossible because we have no information about the status of the post-vaccination immunity in children and adolescents.

It should be noted that young children (age 0-3 years) with hyperergic tuberculin sensitivity (tuberculin test Mantoux >15 mm) with no morphological changes are equivalent to diseased patients. These children are treated by the rules.

TB treatment is a long process and is not always accompanied by a favorable end. We should not forget that in the last 60 years there are no new anti-TB drugs. It is generally accepted that the minimal therapeutic period is 6 months. Of course, there are formulations which are treated for 8 to 10 or 12 to 15 months. This rule is valid for the entire world and is dictated by the specificity of the etiology and the complex relationship between the micro- and macro-organism. All children with evidence of TB and all diseased children are treated at the University Pediatric Clinic of Lung Diseases “St. Sofia” – Sofia. Treatment is free and facilities for modern diagnosis and treatment at a European level are provided. Crucial to the success of the therapeutic process is the control of the ongoing phase of treatment after discharge from hospital. Our efforts are focused in this direction, with the help of all specialized hospitals and through the program for improvement of TB control under the auspices of the UN Global Fund.

The unsystematic, irregular and interrupted treatment is the basis for manifestations of drug resistance. This is known as MDR-TB (Multi-drug-resistant TB) in medical literature. When this resistance affects more anti-TB drugs, we have XDR-TB (Extensively drug-resistant TB).

Emergence of resistant strains of TB in children and adults is a new phenomenon in the world and represents a major challenge in the new century.

Diagnosis of TB in children is a difficult problem to solve. Even more difficult is the diagnostic problem in infancy.

The art in the diagnosis of TB is its detection before

причинител и сложните взаимоотношения между микро- и макроорганизма. Всички деца с показания за туберкулоза и всички болни деца се лекуват в Университетска детска клиника за белодробни болести, СБАЛББ „Св. София” – гр. София. Лечението е безплатно, като са осигурени условия за съвременна диагностика и лечение на европейско ниво. Изключително важен за успеха на терапевтичния процес е контролът върху продължаващата фаза на лечение след изписване от болница. В това направление са насочени и нашите усилия както с помощта на всички специализирани лечебни заведения, така и чрез програмата за подобряване на контрола на туберкулозата под егидата на Глобалния фонд при ООН.

Несистемното, неправилно и прекъсвано лечение е в основата на прояви на лекарствена резистентност. Същата е известна в медицинската литература като MDR-TB (Multidrug Resistance Tuberculosis). Когато тази резистентост засегне повече противотуберкулозни медикаменти, има наличие на XDR-TB (Extremely Drug Resistance Tuberculosis).

Появата на резистентни щамове на туберкулоза у деца и възрастни е нов феномен за света и ще представлява голямо предизвикателство през новото столетие.

Диагностиката на туберкулозата в детска възраст е труден за решаване проблем. Още по-труден е диагностичният проблем в ранната детска възраст.

Искуството в диагностицирането на туберкулозата е нейното установяване преди появата на морфологични промени в различни органи и системи. България разполага с всички диагностични критерии и алгоритми за всяка форма на туберкулозно заболяване.

Успехът в борбата с туберкулозата у децата е възможен при наличие на добра организация на противотуберкулозната борба и обединени усилия на ОПЛ, педиатри, специалисти по детска пневмология и фтизиатрия и всички специалисти за отделните форми на извънбелодробна туберкулоза.

Адрес за кореспонденция:

Проф. д-р Петко Минчев, д.м.н.
Университетска детска клиника по белодробни болести
„Св. София”
бул. ”Акад. Иван Гешов” № 17
1431, София
e-mail: p_minchev@mail.bg

the onset of morphological changes in various organs and systems. Bulgaria has all the diagnostic criteria and algorithms for all forms of the TB disease.

Success in the fight against TB in children is possible when there is good organization of the anti-TB fight and united efforts of GPs, pediatricians, pediatric pneumology and phthisiatrics specialists and all professionals for the various forms of extrapulmonary TB.

Address for correspondence:

Prof. Petko Minchev, MD, PhD, DSc
St. Sofia University Pediatric Clinic of Pulmology
17 Akad. Ivan Geshov Blvd
1431, Sofia
e-mail: p_minchev@mail.bg

REFERENCES

1. Минчев П. Туберкулини и туберкулинова чувствителност, 1996.
2. Минчев П. Терапевтични режими при деца с различни форми на първична туберкулоза. Дис. София. 1998.
3. Clinical tuberculosis. 4th edition. Ed. by Davies PDO, PF Barns, S.B. Gordon. CRC Press. 2008, 189-205, 243-253, 411-431.
4. Handbook of tuberculosis. Ed. by Kaufmann H.E. Helden P. Wiley-Blackwell. 2008, pp.131, 165, 194, 245-253.
5. Cole S.T. Katleen D.E., Murry D.N.Mi, William K.J. Tuberculosis and tubercle Bacillus. ASM Press. 2005, pp.115-143