СЕЗОННА ВАРИАБИЛНОСТ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ

Йото Йотов

*Втора Кардиологична клиника – неинвазивна,
МБАЛ „Св. Марина“, Варна,
УНС по кардиология и ревматология,
Катедра по вътрешни болести,
Факултет по медицина
Медицински университет – Варна*

РЕЗЮМЕ

Артериалната хипертония (АХ) е най-честото заболяване по света и е основен рисков фактор за експесивна болестност и смъртност. Артериалното налягане (АН) при хората показва различни видове вариабилност: от свръхостра при всеки сърдечен удар до дългосрочна, като сезонната. Болестността и смъртността, особено от сърдечно-съдови заболявания, показва определена връзка с външната и вътрешната температура, като нараства през студените месеци и намаляват през лятото. Представени са доказателства за това, че сезонността е важен прогностичен фактор. До голяма степен тези сезонни промени са в резултат на сезонната вариабилност на АН. Редица проучвания показват разлика в АН през различните сезони на годината, включително и в България. Прави се извод, че сезонната вариабилност повлиява контрола на АН и са необходими нови проучвания как да се въздейства върху този феномен.

Ключови думи: артериална хипертония, артериално налягане, сезонна вариабилност

Артериалната хипертония и нейното значение като болестотворен фактор

Артериалната хипертония (АХ) е често срещано заболяване, като между една пета и една трета от населението над 18 години по света има повишени стойности на артериалното налягане (АН). Разпространението ѝ не зависи от икономическото състояние или климата, като честотата ѝ е 33% в африканските страни и до 19% в Южна Америка. Болестността нараства стръмно с възрастта (1-4). За България данни от голямото епидемиологично проучване на Световната здравна организация CINDI сочат честота на АХ през 2007 г. 31% от населението. И у нас тя нараства с възрастта, като всеки втори мъж или жена над 55 год. вече е с повишено АН (5).

АХ е основен рисков фактор за развитие на сърдечно-съдово заболяване (ССЗ). Изчислено е, че около 35% от всички исхемични съдови инциденти (6). В световен мащаб, около 57% от мозъчните

SEASONAL VARIABILITY OF BLOOD PRESSURE

Yoto Yotov

*Second Cardiology Clinic – Noninvasive,
St. Marina University Hospital, Varna,
ESS Cardiology and Rheumatology,
Department Internal Medicine,
Faculty of Medicine,
Medical University of Varna, Bulgaria*

ABSTRACT

Arterial hypertension (AH) is the most common disease worldwide and a major risk factor for the excess morbidity and mortality. Blood pressure (BP) in humans shows various types of variability: from hyperacute with every heart beat to more long-term, such as the seasonal. The morbidity and mortality, especially from cardiovascular diseases, show the definite relationship with the outdoor and indoor temperature. It increases during the colder months and drops down in summer. Evidence about the fact that seasonality is an important prognostic factor is presented. These seasonal changes in disease occurrence are to a great extent due to the seasonal variability of BP. Many studies show the BP variation during the different seasons of the year, including our experience in Bulgaria. Conclusions are made that seasonal variability in BP affects the AH control and that new studies are needed to test how to influence this phenomenon in the future.

Keywords: arterial hypertension, blood pressure, seasonal variability

Arterial Hypertension and Its Importance as a Morbidity Factor

Arterial hypertension (AH) is a common disease and between one fifth and one third of the world population under 18 years of age has elevated BP levels. Its spread does not depend on the economic status or the climate. Its prevalence is 33% in the African countries and 19% in South America. Its morbidity increases steeply with the progress of age (1-4). For Bulgaria, data from CINDI - the large epidemiological study of the World Health Organization (WHO), indicate an AH incidence of 31% of the general population for 2007. In our country, it also increases with the progress of age and every other man or woman over 55 years of age already has elevated blood pressure (BP) (5).

AH is a main risk factor for the development of a cardiovascular disease (CVD). It has been calculated that it comprises 35% of all ischemic vascular accidents (6). Worldwide, about 57% of ischemic strokes (IS) and 47% of the cases of coronary artery disease (CAD)

инсулти (МЗИ) и 47% от случаите на коронарна болест на сърцето (КБС) се дължат на АХ (7). Резултатите от популационно проучване на над един милион участници сочат, че смъртността от тези социално значими заболявания нараства линейно и прогресивно с покачване на АН, в сравнение с референтната група с АН 115/75 mm Hg. За всеки 20 mm Hg повишение на систолното АН (САН) и за всеки 10 mm Hg повишение на диастолното АН (ДАН) смъртността от ССЗ нараства двукратно (8). Връзката на повишеното АН със смъртността от мозъчен инсулт е правопрпорционална и линейна, като последната често се използва като маркер за оценка на ефективността на лечението на АХ (9). Тя е втората по важност причина за развитие на бъбречна недостатъчност (10) и е водеща причина за развитие на сърдечна недостатъчност (СН) и предсърдно мъждене (11,12).

Отдавна е известно, че АН показва непрекъснати непредизвикани вариации при един и същи индивид. Дълго време тези „спонтанни“ флуктуации на АН са били пренебрегвани като несъществени или много променливи. Сега интраиндивидуалната вариабилност на АН (ВАН) се приема като доказан научен факт от повечето изследователи и следва да се отчита въздействието ѝ при оценка на прогнозата и лечението на болните.

Тези индивидуални промени в АН са няколко вида в зависимост от времето на действието им (13):

- Свърхкраткосрочни – между отделните сърдечни цикли, известна още като удар-след-удар (beat-to-beat) ВАН;
- Краткосрочни, минути до часове, най-често в рамките на 24 часа;
- Дългосрочни – за дни, месеци и години:
 - Визита-до-визита ВАН
 - Сезонна вариабилност на АН.

Сезонност в заболяемостта и смъртността

Промяната във външните атмосферни условия и сезонните температурни разлики оказват неблагоприятно влияние върху здравето на хората в районите, където те са налице. Сезонните вариации в заболяемостта и смъртността, показват зимен пик и летен спад. Преобладаващата смъртност през зимните месеци е най-вече в резултат на сърдечно-съдови събития, като остър миокарден инфаркт (ОМИ), МЗИ, внезапна сърдечна смърт (ВСС) и белодробна тромбоемболия (14). Данни от регистър в Канада показват, че смъртността от ОМИ е била най-висока през м. януари, с релативен риск (RR) 1,09 спрямо средногодишната честота и най-ниска през м. септември с RR 0,90, което прави разлика от 18,6% (15). Сезонната ва-

are a result of АН (7). The results from a population study including over one million participants indicate that the mortality of these socially significant diseases increases linearly and progressively with the increase of BP, compared to the reference group with BP levels of 115/75 mm Hg. For every 20 mmHg increase in the systolic BP (SBP) and for every 10 mmHg increase in the diastolic BP (DBP), the CVD mortality rate increases twofold (8). The relationship between the increased BP and the IS mortality rate is directly proportional and linear with the latter often being used as a marker for assessment of the efficiency of the АН therapy (9). It is the second most important reason for the development of kidney failure (10) and the leading cause for the occurrence of heart failure (HF) as well as atrial fibrillation (11,12).

It has been known for a long time that BP exhibits continuous unprovoked variations in the same individual.

For a long time these “spontaneous” fluctuations were ignored as insignificant or too varied. Nowadays, the intra-individual BP variability (BPV) is accepted as a scientifically proven fact by most researchers and its impact must be accounted for when assessing the prognosis and the management of the patients.

These individual changes in BP can be divided into several types depending of their duration (13):

- Extremely short-term – between the separate cardiac cycles, also known as beat-to-beat BPV;
- Short-term, minutes to hours, most commonly within 24 hours;
- Long-term – days, months, and years:
 - Visit-to-visit BPV
 - Seasonal variability of BP.

Seasonality of Morbidity and Mortality

The change in the atmospheric conditions and the seasonal temperature changes have an adverse impact on human health in the regions where there are such. The seasonal variations in the morbidity and mortality rates show a winter maximum and a summer drop. The predominant winter-month mortality is mostly a result of the cardiovascular events, such as acute myocardial infarction (AMI), IS, sudden cardiac death (SCD) and pulmonary thromboembolism (14). Data from a Canadian registry showed that the AMI mortality was the highest during the month of January with a relative risk (RR) of 1.09 compared to the average annual rate, and the lowest in September with RR 0.90, which lead to a difference of 18.6% (15). The seasonal variation increases with age – from 5.8% at an age <65 years to 15.8% at >85 years. The difference in the relative risk of IS mortality between summer and winter is even greater – 19.9% and it also

риация нараства с възрастта – от 5,8% при възраст <65 год. до 15,8% при >85 год. Разликата в релативния риск за смърт от МЗИ между лято и зима е дори още по-голяма – 19,9% и също нараства с възрастта. Голямо епидемиологично проучване (16) на 19 019 английски държавни служители на възраст 40-69 год., които са проследени за период от 25 год., показва сезонност в общата смъртност, с отношение на най-високата честота през зимата и най-ниската през лятото 1,22, 95% интервал на доверителност (CI):1,1-1,3. Данни от Холандия доказват, че 66% от по-голямата обща смъртност през зимата е в резултат на ССЗ, докато респираторните състояния допринасят само 13% (17). В проучване в Минесота, САЩ, ВСС е била по-висока при ниски температури под 0°C отколкото при температури 18-30°C, с RR 1,20, 95%CI 1,07-1,35. Асоциацията между студеното време и ВСС е била сходна през годините, във всички възрасти и при двата пола (18). Сходни резултати, обаче, са получени и в страни с по-малки колебания във външната температура. При изследване на близо 1 млн жители в Израел смъртността от ИБС и МЗИ при мъже е била съответно с 51 и 48% по-голяма в средата на зимата, а при жените разликите във фарталните ССЗ между лято и зима са били съответно 48 и 40% (19). При преглед на всички смъртни случаи от ОМИ в Атина, Гърция, за 2001 г. P Dilaveris и сътр. (20) установяват, че фаталните ОМИ през зимата (декември) са с 31,8% повече отколкото през лятото ($p<0,001$), като зависимостта е била значима при възрастните болни и по-слаба при младите. Най-добър предиктор на дневната смъртност от ОМИ в тази популация с мек средиземноморски климат е била външната температура през предходните 7 дни ($p<0,001$). В проучването FINMONICA честотата на исхемичен МЗИ е била с 12% (95%CI 5%-20%) по-висока при мъжете и с 11% (95%CI, 4%-19%) при жените през зимата в сравнение с лятото (21). Подобна е съобщаваната корелация между МЗИ и годишните сезони в Япония (22) и в Австралия (23). Голямо популационно проучване в Дания, проведено в продължение на 14 години и включващо около 33 000 болни с пароксизмално предсърдно мъждене (ПМ), показва обратна пропорционална зависимост между появата на аритмията и средната външна температура и подобен ефект на сезона, през който се явява тя – релативен риск на честотата зима/лято $RR=1,20$; 95%CI=1,12-1,29 (24).

Патогенезата на неблагоприятните ефекти на зимните месеци върху ССЗ заболяемост и смъртност е свързана с излагане на влиянието на студеното

increases with age. A vast epidemiological study (16) involving 19 019 British state employees at an age of 40-69 years, who were followed up for a period of 25 years showed seasonality in the overall mortality, with ratio of 1.22 between the highest rate during the winter and the lowest one during the summer, with 95% confidence interval (CI):1.1-1.3. Data from the Netherlands prove that 66% of the highest overall mortality during the winter season is a result of CVDs, whereas the respiratory conditions contribute to only 13% of it (17). In a study from Minnesota, USA, SCD was higher in lower temperatures, under 0°C, than in 18-30°C temperatures, with RR 1.20, and 95% CI 1.07-1.35. The association between cold weather and SCDs was similar throughout the years, in all age groups and in both genders (18). However, similar results were obtained in countries with less variation in the outside temperature. In a study involving nearly 1 million Israelis, the CAD and IS mortality in men was 51 and 48%, respectively, higher in the middle of the winter season and among women, the difference between the fatal CVDs in summer and winter was 48 and 40%, respectively (19). When examining all lethal outcomes from AMI in Athens, Greece in 2001, Dilaveris et al. (20) determined that the fatal AMIs during the winter (December) are 31.8% more than those during the summer ($p<0.001$) with a stronger correlation in older patients and weaker one in younger individuals. The best predictor of daily AMI mortality in this population with mild Mediterranean climate was the outside temperature in the preceding 7 days ($p<0.001$). In the FINMONICA trial, the IS incidence was with 12% (95%CI 5%-20%) higher in men and by 11% (95%CI, 4%-19%) higher in women in winter, compared to summer (21). Similar is the reported correlation between IS and the annual seasons in Japan (22) and Australia (23). A vast population research in Denmark, conducted in the span of 14 years and including about 33 000 patients with paroxysmal atrial fibrillation (AF) showed an inversely proportional relationship between the occurrence of arrhythmia and the average outside temperature, as well as a similar seasonal effect – a relative risk of the incidence winter/summer $RR=1.2$; 95%CI=1.12-1.29 (24).

The pathogenesis of the adverse effect of the winter months on the CVD morbidity and mortality is linked to cold weather exposure. This leads to physiological and clinical changes in the human organism, including activation of the sympathetic nervous system, hemocoagulation, increased blood clotting, increased plasma lipids and infection incidence, etc. Cold weather leads to a direct impact on the cardiovascular system with a coronary and peripheral arterial vasospasm. The

Fig. 1. The complex relationship between the environmental temperature and the blood pressure (BP) levels, and the known determinants.

* - changes in the levels of office systolic and diastolic BP, home BP and the outpatient monitored BP;

** - A significant increase in the night-time BP with the increase of outside temperature in the summer was observed in hypertensive patients. CV – cardiovascular; T- temperature

време. Това води до физиологични и клинични промени в организма на човек, които включват активиране на симпатиковата нервна система, хемоконцентрация, повишена съсирваемост на кръвта, повишение на плазмените липиди и на честотата на инфекциите и др. Студеното време води до директни ефекти върху сърдечно-съдовата система с коронарен и периферен артериален вазоспазм. Патологичните ефекти на зимата за развитие на ССЗ са обобщени на Фиг.1.

Сезонна вариабилност на артериалното налягане Това е вид дългосрочна ВАН, при която АН променя стойностите си през различните месеци на годината. Сезонните промени в АН са наблюдавани още през 60-те години на XX-ти век от сър Джефри Роуз, който е наблюдавал АН на 56 мъже за период от 1 до 3 години и установява пик през пролетта и най-ниски стойности през лятото. По-късно RF Heller и сътр. от същия колектив (1978) съобщават за обратна зависимост между стайната

pathophysiological effect of winter on the development of CVDs is summarized on Fig. 1.

Seasonal Variability of Blood Pressure

This is a type of long-term BPV where BP changes its levels in the different months of the year. Seasonal BP changes have been observed in the 1960s by Sir Geoffrey Rose who monitored the BP of 56 men for a period of 1 to 3 years and determined a maximum in the spring season. In the summer, he registered the lowest levels. Later, RF Heller and associates from the same team (1978) reported an inverse relation between room temperature and DBP when measuring BP in the United Kingdom Heart Disease Prevention Project (25). Population studies confirm the higher BP levels in colder months. In the US, data from a large group of patients, followed and treated at 57 clinical practices by 730 medical specialists for the period September, 1996 – May, 2004, were summarized (26). In this period, 2 million BP measurements were done on 248 123 individuals at an average age of 53 ± 18 years (from

температура и ДАН при измервания на АН в Проекта за превенция на сърдечните заболявания във Великобритания (25). Популационни проучвания потвърждават наличие на по-високи стойности на АН през по-студените месеци. В САЩ са обобщени данните от голяма група пациенти, наблюдавани и лекувани в 57 клинични практики от 730 медицински специалисти за периода септември 1996-май 2004 год. (26). За това време са били направени над 2 млн измервания на АН на 248 123 лица на средна възраст 53 ± 18 год (от 18 до 106 год.), от които 55,4% са били жени. Около половината от тях - 46%, са имали АХ и 88% от хипертониците са били лекувани медикаментозно. Най-ниски стойности на средното САН са установени през месеците юни и юли - 125,0 mm Hg, а най-високо е било м. януари - 127,1 mm Hg ($p < 0,001$). Същата тенденция е наблюдавана в диастолното АН (ДАН), с пик през м. януари 76,3 mm Hg и най-ниско средно ДАН през м. юни-август - 75,1 mm Hg; $p < 0,001$ (Фиг. 2). В клиничното изпитване The

18 to 106 years), of which 55.4% were women. About half of them - 46%, had AH and 88% of the patients with hypertension were treated with medicaments. The lowest levels of average SBP were established in the months of June and July - 125.0 mmHg, and the highest - in January - 127.1 mmHg ($p < 0.001$). The same trend was observed in DBP with a maximum in January - 76.3 mmHg and the lowest average DBP - in the months June-August - 75.1 mmHg; $p < 0.001$ (Fig. 2). The Medical Research Council (MRC) clinical trial for treatment of AH with DBP 90-109 mmHg, which was conducted in the 1970s and 1980s, included over 17 000 individuals from 190 centers in England, Scotland and Wales (27). It reported a clearly marked pressure effect of the low outside temperatures - the median difference between the months of March and July was 4.9 mmHg for SBP and 2.9 mmHg for DBP. The changes throughout the year were directly linked to age with men, 55-64 years of age, having office SBP by 6-7 mmHg and DBP by 3-4 mmHg higher during the winter season compared to the warm summer months

Fig. 2. Possibility of systolic blood pressure (SBP) ≥ 120 mmHg based on the month of the year, time of the day, and the day of the week (Thomas C et al., 2008)

Medical Research Council (MRC) за лечение на лека АХ с ДАН 90-109 mm Hg, което се проведе през 70-те и 80-те години на XX век, са включени над 17 000 лица в 190 центъра в Англия, Шотландия и Уелс (27). Съобщава се за ясно изразен пресорен ефект на ниските температури навън – средната разлика между месеците март и юли е била 4,9 mm Hg за САН и 2,9 mm Hg за ДАН. Промените през годината са били пряко свързани с възрастта като при мъже на възраст 55-64 год. офисното САН е било с 6-7 mm Hg и ДАН с 3-4 mm Hg по-високи през зимните дни отколкото през топлите летни дни с разлика 20° C; при мъже на възраст 35-44 год. съответните стойности на САН и на ДАН са били съответно 2-4 mm Hg и 2-3 mm Hg. Подобни ефекти на външната температура върху АН са наблюдавани и при жените.

Интересна обратна корелация между телесно тегло и сезонна промяна на АН наблюдават Kristal-Boneh Е и сътр. (1996), които са изследвали 101 здрави нормотензивни мъже на възраст между 28 и 63 год. с 24-часово амбулаторно мониториране на АН през лятото и зимата (28). Те намират, че процентът на лицата с повишение на САН с повече от 10 mm Hg през зимата в сравнение с лятото е бил по-висок при тези с най-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) и най-малък при мъжете с най-голямо телесно тегло - 35% с/у 8%, респективно, $p < 0,0001$. След корекция за множество замъгляващи фактори промяната в средното САН от лятото към зимата е била обратно свързана с ИТМ при линейна регресия с коефициент $\beta = -0.26$, $p = 0,0149$. Не е намерена асоциация между ДАН и ИТМ. Подобна корелация между телесното тегло и АН през годината е намерена и в горепосоченото проучване MRC (27).

Особено чувствителни на промените във външната температура са възрастните хора поради нарушената барорефлексна дейност, което води до полесна вазореактивност и по-чести СС инциденти през зимата (29). В проучването Три града (The Three-City Study) във Франция са проследени за 26 месеца 8801 лица над 65 год., средна възраст $73,4 \pm 5,6$ год., от които 39,4% са били мъже (30). АН се променя значимо през четирите сезони на годината, като разликата между двата крайни квинтила на външната температура ($< 7,9^\circ\text{C}$ и $\geq 21,2^\circ\text{C}$) е била 8 mm Hg за САН – 150,1 с/у 142,1 mm Hg, и 2,9 mm Hg за ДАН – 82,8 с/у 79,9 mm Hg, $p < 0,001$ за линеен тренд. Тази връзка се наблюдава независимо от възрастта, пола и центъра на изследване. Промените в АН с промяна на външната температурата при по-възрастните е била

with a temperature difference of 20° C. For men at the age of 35-44 years the respective SBP and DBP levels were by 2-4 mmHg and 2-3 mmHg higher. Similar effect of outside temperature on BP was observed in women as well.

An interesting inverse correlation between body weight and BP seasonal changes was noted by Kristal-Boneh and associates (1996), who examined 101 healthy normotensive males at an age between 28 and 63 years with 24-hour outpatient BP monitoring during the summer and the winter season (28). They found that the percentage of individuals with an SBP increase of more than 10 mmHg in the winter, compared to that of the summer season, was larger in those with the lowest body mass index (BMI) and smallest in men with the highest body weight – 35% vs. 8, respectively, $p < 0.0001$. After correcting for the numerous interfering factors, the change in the average SBP from summer to winter was inversely related to BMI in a linear regression with a coefficient $\beta = -0.26$, $p = 0.0149$. No association between DBP and BMI was found. A similar correlation between body mass and BP throughout the year was established in the aforementioned MRC study as well (27).

Especially sensitive to outside temperature changes are older people due to the impaired baroreflex activity, which leads to easier vasoreactivity and more frequent cardiovascular accidents during the winter (29). The Three-City Study in France followed up 8801 individuals for 26 months. They were over 65 years of age, at an average age 73.4 ± 5.6 years. Of them 39.4% were men (30). BP changed significantly in the four seasons with the difference between the two end quintiles of outside temperature ($< 7.9^\circ\text{C}$ and $\geq 21.2^\circ\text{C}$) being 8 mmHg for SBP – 150.1 vs. 142.1 mmHg, and 2.9 mmHg for DBP – 82.8 vs. 79.9 mmHg, $p < 0.001$ for a linear trend. This correlation was observed regardless of age, gender or research center. The BP changes brought by the outside temperature changes were more significant in older individuals. For every 15°C decrease in the outside temperature SBP increased by 0.8 mmHg in patients at the age of 65-74 years and by 5.1 mmHg in the oldest ones (≥ 80 years). For each 15°C increase SBP decreased by 9.9 mmHg in the youngest age group vs. 13.8 mmHg in individuals at the age of 80 or more. The DBP changes were similar. A link between age and seasonal changes was established also by Japanese authors (31). They observed, in 15 healthy Japanese individuals at an average age of 79.3 ± 5.9 years, maximum BP levels in February (129 ± 14 and 81 ± 13 mmHg) and the lowest established were in August (117 ± 11 and 73 ± 10 mmHg). During the same months, the highest (29.2°C) and the lowest

по-значима. За всеки 15°C понижение на външната температура САН се увеличава с 0,8 mm Hg при лица на възраст 65-74 год. и с 5,1 mm Hg при най-възрастните (≥ 80 год.) При всяко покачване с 15°C САН намалява с 9,9 mm Hg в най-младата възрастова група с/у 13,8 mm Hg при лица на 80 или повече години. Подобни са промените и в ДАН. Връзката между възрастта и сезонните промени са намерени и от японски автори (31). Те са наблюдавали при 15 здрави японци на средна възраст 79,3 $\pm$ 5,9 год. пикови стойности на АН през февруари (129 $\pm$ 14 и 81 $\pm$ 13 mm Hg) и най-ниски през август (117 $\pm$ 11 и 73 $\pm$ 10 mm Hg). През същите месеци са отчетени и най-високата (29,2°C) и най-ниската (5°C) средномесечни температури на въздуха. Не е изненада, че САН и ДАН показват значима обратна корелация с външната температура, с $r = -0,973$ и $r = -0,985$, $p < 0,001$, респективно. Всеки 1°C понижение на средната външна температура е било свързано с покачване на САН с 0,43 mm Hg и на ДАН с 0,29 mm Hg. В проучването PAMELA в Италия са наблюдавани 2051 лица, половината мъже на средна възраст 50 год. (32). Стойностите на АН при всички са били сигнификантно по-високи през зимата отколкото през лятото, независимо от начина на измерване. Най-високи стойности на АН са измерени през януари и февруари, а най-ниски – през юли и септември, тъй като през август не е имало измервания. Дългосрочните промени със сезоните в АН променят и циркардния му ритъм. S Murakami и сътр. (32) изследват хипертоници в Япония чрез 24 ч амбулаторно мониториране на АН и установяват, че сутрешното АН и покачването на сутрешното АН преди събуждане от сън са били значимо по-високи през най-студения ден отколкото тези през най-топлия – сутрешно покачване преди събуждане 20,8 $\pm$ 1,3 mm Hg с/у 15,3 $\pm$ 1,3 mm Hg, $p = 0,0004$. В същото време, големината на нощното понижаване на АН е било сигнификантно по-голямо през студения дни отколкото през горещите месеци - 15,8% $\pm$ 0,7% с/у 13,9% $\pm$ 0,7%, респективно ($p = 0,01$). Подобни промени в офисното и средното 24-ч АН са описани и от Modesti PA и сътр. (33) при 6404 лица, прегледани в 2 амбулаторни хипертонични клиники в Италия. Офисното и средното 24-часово САН, както и сутрешното покачване на АН са били сигнификантно по-ниски през горещите дни (респективно 136 $\pm$ 19, 130 $\pm$ 14 и 33 $\pm$ 16 mm Hg) и по-високи през студения дни (141 $\pm$ 12, 133 $\pm$ 11 и 37 $\pm$ 9 mm Hg), когато се сравняват с дни с умерени температури (138 $\pm$ 18, 132 $\pm$ 14 и 35 $\pm$ 15 mm Hg). Данните от мащабното епидемиологично

(5°C) average month temperatures were registered. It is of no surprise that SBP and DBP showed a significant inverse correlation with the outside temperature, with $r = -0,973$ and $r = -0,985$, $p < 0,001$, respectively. Every 1°C decrease of the average outside temperature was linked to an SBP increase by 0.43 mmHg and a DBP one by 0.29 mmHg. The PAMELA study in Italy included 2051 individuals, half of them men at an average age of 50 years (32). The BP levels in all of them were significantly higher in the winter than in the summer regardless of the way of measurement. The highest BP levels were measured in January and February, and the lowest ones – in July and September due to the fact that there were no measurements during the month of August. The long-term seasonal changes of BP change its circadian rhythm as well. S. Murakami and associates (32) examined hypertensive patients in Japan by 24-hour outpatient BP monitoring and determined that the morning BP and its increase before waking up were significantly higher in the coldest day than in the warmest – morning increase before waking up 20.8 $\pm$ 1.3 mmHg vs. 15.3 $\pm$ 1.3 mmHg, $p = 0.0004$. At the same time, the level of the night-time BP decrease was significantly higher in the colder days than in the warmer months – 15.8% $\pm$ 0.7% vs. 13.9% $\pm$ 0.7%, respectively ($p = 0.01$). Similar changes in the office and average 24-hour BP were described by Modesti and associates (33) in 6404 patients examined in 2 outpatient hypertension clinics in Italy. The office and average 24-hour SBPs, and the morning BP increase were significantly lower in the warmer days (136 $\pm$ 19, 130 $\pm$ 14, and 33 $\pm$ 16 mmHg, respectively) and higher in the colder days (141 $\pm$ 12, 133 $\pm$ 11, and 37 $\pm$ 9 mmHg) when being compared with days with moderate temperatures (138 $\pm$ 18, 132 $\pm$ 14, and 35 $\pm$ 15 mmHg). Data from the vast epidemiological study MONICA, conducted by WHO in many countries in the world, were analyzed focusing on the link between the season, inside and outside temperature, short-term changes in the outside temperature, and BP. Twenty-five patient populations from 16 countries were studied. The researchers obtained SBP measurements from 115 434 participants (34). Each degree of temperature increase lead to an average decrease of SDP by 0.31 mmHg (95% CI: -0.44, -0.19). An increase by 1°C in the outside temperature decreases BP by 0.19 mmHg on average (95% CI: -0.26, -0.11). The higher outside, but not inside, temperature has a more pronounced effect on women than on men. Short-term temperature changes have no significant effect on SBP. A vast study from China (35) with over 500 000 participants at the age of 30-79 years showed a considerable BP increase, 10/4 mmHg on average, from summer (June to August) to

проучване MONICA, организирано в много страни на света от СЗО, са анализирани за връзката между сезона, вътрешна и външна температура, краткосрочната промяна във външната температура и АН. Проучени са 25 популации в 16 страни и изследователите са разполагали с измервания на САН на 115 434 участници (34). Всеки градус повишаване на температурата в дома е намалявало САН средно с 0,31 mm Hg (95% CI: -0,44, -0,19). Един °C повишаване на външната температура намалява АН средно с 0,19 mm Hg (95% CI: -0,26, -0,11). По-високата околна, но не и вътрешна температура, имат по-голям ефект при жените, отколкото при мъже. Краткосрочните температурни промени нямат сигнификантен ефект върху САН. Машабно проучване в Китай (35) с над 500 000 участници на възраст 30-79 год. показва значимо нарастване на АН средно с 10/4 mm Hg от лятото (юни до август) към зимата (декември до февруари). Намира се сигнификантна обратна корелация между външната температура на въздуха (от 5°C нагоре) и АН, като за всеки 10°C спадане то се покачва средно с 5,7/2,0 mm Hg. Сезонната разлика в АН е била по-голяма при лица от селски региони отколкото при живеещи в града – 12/5 c/y 8/2 mm Hg ($p<0,0001$ за интерактивна връзка), като тя е варирила между 4/0 и 16/7 mm Hg в различните региони.

Някои изследователи считат, че не външната, а вътрешната температура в домовете и на работното място. В проучване на 101 здрави нормотензивни лица (36) изследователите намират повисоки стойности на АН по време на работа през зимата отколкото през лятото – средно САН съответно 130,7 c/y 127,7 mm Hg ($p<0,03$) и средно ДАН 78,1 c/y 74,8 mm Hg ($p<0,003$), със средна сезонна разлика 3,4 mm Hg за САН ($p=0,035$) и 3,3 mm Hg ($p<0,003$) за ДАН. Тази сезонна асоциация, обаче, е опосредствана от промените във вътрешната температура. Многофакторен линеен регресионен анализ на данните от 97 работници, направен от същия колектив (37), показва, че САН по време на работните часове е било независимо свързано с вътрешната температура в работната среда ($p<0,0001$), с наличието на тютюнопушене ($p<0,0001$) и със сезона ($p<0,0001$).

Вариация на АН през различните сезони е регистрирана и у нас. В проучването Диета и МЗИ във Варна, проведено през 2000 г., са изследвани общо 160 лица от Варна и региона (38). Резултатите показват значима вариация в АН през годината. През летния сезон стойностите на „обичайното САН“ намаляват средно с 12 mm Hg (14,4 при мъжете от

winter (December to February). There is a significant inverse correlation between the outside temperature (5°C and up) and BP. For each 10°C drop it increased by 5.7/2.0 mmHg on average. The seasonal BP difference was greater in individuals from rural regions than in those from urban environments - 12/5 vs. 8/2 mmHg ($p<0.0001$ for interactive link) with the variation being between 4/0 and 16/7 mmHg in the different regions. Some researchers think that not outside, but inside temperature in homes and offices plays a role. In a study involving 101 healthy normotensive individuals (36), the researchers established higher average levels of BP during work in winter than in summer – average SBP 130.7 vs 127.7 mmHg ($p<0.03$), respectively, and average DBP of 78.1 vs. 74.8 mmHg ($p<0.03$) with an average seasonal difference of 3.4 mmHg for SBP ($p=0.035$) and 3.3 mmHg ($p<0.003$) for DBP. However, this seasonal association is mediated by the changes of inside temperature. Multifactorial linear regression analysis on the data from 97 workers conducted by the same team (37) showed that working-hour SBP was independent of the inside temperature at the workplace ($p<0.0001$), smoking ($p<0.0001$) or the season ($p<0.0001$).

A BP variation during the different seasons has been registered in our country as well. In the Diet and IS study in Varna, conducted in the year 2000, a total of 160 individuals from Varna and the region were examined (38). The results showed a significant BP variation throughout the year. In the summer season, the level of the “usual SBP” decreased by 12 mmHg on average (14.4 in men from rural areas and 12.8 in women from the same areas, and 12.8 in women from urban settings and 8.7 in men from the same areas). The DBP decrease is by 5 mmHg on average. It is highest in men from rural areas – 8 mmHg, followed by women from

Fig. 3. Average levels and 95% confidential interval (CI) of „usual BP” by gender, location and season

село и 12,8 при жените от село, 12,7 при жените от града и с 8,7 при мъжете от града). Намалението при ДАН е средно с 5 mm Hg. То е най-голямо при мъжете от селския район – 8 mm Hg, следвани от жените в града – 6 mm Hg, жените в село и мъжете в града – с по 5 mm Hg (Фиг. 3). Величината на сезонното вариране не се различава значимо между групите по пол и местоживееене ($p=0,17$); засяга както хипертоници, така и нормотоници и няма връзка с провеждането на АХ лечение ($p=0,71$). Относителният дял на лицата в извадката със стойност на $АН \geq 140/90$ mmHg е със 17% по-висок през зимния сезон спрямо относителния дял определен въз основа на „обичайното АН“. Респективно, относителният дял на хипертониците през летния сезон е с 22% по-нисък от измерения въз основа на „обичайното АН“. При сравняване на АН за Варненски район със средните стойности на АН от проучването МОНИКА, ранговата позиция на Варна се променя от 2-ра през зимния сезон на 21-ва през лятото при мъжете; при жените мястото се променя от 19-то през зимата на 37-мо през лятото.

Сезонността на АН влияе върху провежданото лечение и контрола на АН. Голяма база данни от застрахователната компания Kaiser-Permanente в Южна Калифорния, която включва над 660 000 пациенти с АХ, показва отлична честота на установяване на АХ – над 90% от хипертониците знаят за повишеното си АН (39). Контролът на АХ е също много добър – около 80% за 2010-2011. Въпреки стриктния контрол и провежданото лечение, налице е разлика в контрола на АН между най-студения месец (февруари) и най-топлия месец (септември) от 2%, при температурната разлика само 9°C. Наличие на по-лош контрол на АН през зимните месеци показва и резултатите от над 2 млн измервания на АН на хипертоници в първична медицинска помощ (26). Рискът за по-лош контрол на АХ, дефиниран като вероятност за $САН \geq 120$ mm Hg, е с 24% по-висок ($p<0,001$) през зимните, отколкото през летните месеци. Тези резултати се потвърждават и от проучване в Япония на близо 18 500 пациенти с АХ (40). Честотата на пациентите с адекватен контрол на АН е била по-ниска през зимата отколкото през лятото както при зададена цел на лечение 140/90 mm Hg (36,2% с/у 43,8%, $p<0,001$), така и при цел под 130/85 mm Hg при лица под 60 години (15,5% с/у 18,6%, $p<0,02$).

Дали медикаментозната терапия влияе на сезонната вариация на АН? Проучването CHIEF (Chinese Hypertension Intervention Efficacy Study) е проведено в провинция Nanchang в Китай (41). В това

urban regions – 6 mmHg, women from rural areas and men from urban settings – 5 mmHg (Fig. 3). The extent of seasonal variation did not differ significantly in the gender and location groups ($p=0.17$). It affected hypertensive and normotensive individuals alike and had no link to the AH therapy ($p=0.71$). The relative share of the participants with $BP \geq 140/90$ mmHg in the sample was by 17% higher in the winter season compared to the relative share based on the “usual BP”. The relative share of hypertensive patients was by 22% lower in the summer season compared to the measurements based on the “usual BP”. When comparing BP in the Varna region with the average BP levels in the MONICA study, Varna’s rank moves from 2nd in the winter season to 21st in the summer in men. For women, the city moves from 19th in the winter to 37th in the summer. BP seasonality influences the conducted therapy and BP control. A large database from the insurance company Kaiser-Permanente in Southern California, which included over 660 000 AH patients, showed an excellent rate of AH diagnosis – over 90% of the hypertensive patients were aware of their elevated BP (39). The AH control was also very good – about 80% for the period 2010-2011. Despite the strict control and conducted therapy, there was a 2% difference in the BP control between the coldest month (February) and the warmest one (September) with a temperature difference of only 9°C. Worse BP control during the winter months is also indicated by the results from over 2 million BP measurements in hypertensive patients in primary medical care (26). The risk of worse AH control, defined as a possibility of $SBP \geq 120$ mmHg, was 24% higher ($p<0.001$) in the winter than in the summer months. These results were also confirmed by a study in Japan involving nearly 18 500 AH patients (40). The share of patients with adequate AH control was smaller in the winter than in the summer, both with a target of 140/90 mmHg (36.2% vs. 43.8%, $p<0.001$) and one under 130/85 mmHg in patients under 60 years of age (15.5% vs. 18.6%, $p<0.02$).

Does Medicament Therapy Influence the Seasonal Variation of BP?

The CHIEF (Chinese Hypertension Intervention Efficacy) study was conducted in the Nanchang province in China (41). In this arm of the study, a total of 332 hypertensive patients were randomized between February and August, 2008 in order to receive a combined therapy with amlodipine-amiloride (AA) or amiloride-telmisartan (AT) in gradually increasing, up to the 12th week, doses. The patients were followed up for 2 years and the effects of the therapy on the BP levels and AH control during the days of the week and the months of the year were noted. A correlation with the average

крило на проучването общо 332 хипертоници са рандомизирани между февруари и август 2008 г. да получават комбинирана терапия с амлодипин-амилорид (АА) или амилорид-телмизартан (АТ) в постепенно покачващи се до 12 седмица дози. Болните са проследени за 2 год. и са отчетени ефектите на лечението върху стойностите на АН и контрола на АХ през дните на седмицата и през месеците на годината. Направена е корелация със средномесечната температура на въздуха в провинцията. Резултатите показват, че АН показва изразена вариация през годината с пик през студения сезон. САН показва нарастване средно с 9,7–10,5 mm Hg през зимния период, докато ДАН се покачва средно с 3,1–3,9 mm Hg. Нивата на контрол на АН през календарния месец са варирали от 58,1% до 95,5%, с най-лоши резултати през студените месеци. Не са наблюдавани значими разлики в нивата на АН, честотата на контрола на АН и сезонната вариация на АН между групите АА и АТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промяната на температурата през сезоните има значение за болестността и смъртността от ССЗ. През студените месеци нараства честотата на сърдечно-съдови инциденти и неблагоприятният изход от тях. Множество са причините за това. Основна сред тях е сезонната вариабилност на АН. Промените в АН са реален феномен, който самостоятелно променя заболяемостта и смъртността. Наблюдава се в различни региони, включително и у нас. По-високото АН през зимните месеци влошава контрола на АХ и повече хипертоници се нуждаят от промяна в лечението си. Както пациентите, така и лекарите интуитивно оценяват значението на сезонната ВАН и ефектът ѝ върху лечението и прогнозата на болните. Необходими са нови проучвания и рандомизирани клинични проучвания за установяване на мястото на сезонната промяна в АН в патогенезата на АХ и начините на повлияване на сезонната вариабилност на АН.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Йото Йотов, д.м.
Втора кардиологична клиника – неинвазивна
МБАЛ „Св. Марина“
Бул. „Христо Смирненски“ 1
9010 Варна
Тел: 052 978230
Факс: 052 302933
е-мейл: y_yotov@yahoo.com

month temperature in the province was established. The results indicated that BP showed a marked variation throughout the year with a cold-season maximum. SBP exhibits an average increase of 9.7–10.5 mmHg in the winter period, while DBP increases by 3.1–3.9 mmHg on average. The levels of BP control in the span of a month varied from 58.1% to 95.5%, with the worst results being observed in the cold months. There were no significant differences in the BP levels, frequency of BP control, and seasonal BP variation between the AA and AT groups.

CONCLUSION

Temperature change during the seasons influences CVD morbidity and mortality rates. In the cold months, the incidence of cardiovascular accidents and their unfavorable outcome increase. There are multiple reasons for this. The main one among them is seasonal variability of BP. BP changes are a real phenomenon, which independently affects morbidity and mortality. They are observed in different regions, our country included. The higher BP during the winter months deteriorates the AH control and more hypertensive patients need a therapy change. Both patients and doctors intuitively assess the importance of seasonal BPV and its effect on patient treatment and prognosis. New research is needed as well as randomized clinical trials in order to establish the place of the seasonal change of BP in the pathogenesis of AH and the ways to influence the seasonal variability of BP.

Address for correspondence:

Assoc. Prof. Yoto Yotov, MD, PhD
Second Cardiology Clinic
MHAT "Sv. Marina"
1 Hristo Smimenski blvd.
9010 Varna, Bulgaria
Tel: +35952978230
Fax: +35952302933
e-mail: y_yotov@yahoo.com

REFERENCES

1. Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension between developing and developed countries. *J Hypertens* 2009; 27:963-975.
2. Macedo ME, Lima MJ, Silva AO, Alcantara P, Ramalhinho V, Carmona J. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Portugal: the PAP study. *J Hypertens* 2005; 23:1661-1666
3. Meisinger C, Heier M, Volzke H, Lowel H, Mitusch R, Hense HW, Ludemann J. Regional disparities of hypertension prevalence and management within

- Germany. *J Hypertens* 2006; 24:293-299.
4. Cifkova R, Skodova Z, Lanska V, Adamkova V, Novozamska E, Jozifova M, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in the Czech Republic. Results of two nationwide cross-sectional surveys in 1997/1998 and 2000/2001, Czech Post-MONICA Study. *J Hum Hypertens* 2004; 18:571-579.
 5. Василевски Н, Г Цолова, Пл Димитров, А Манолова. Изследване на факторите на риска за хронични неинфекциозни болести сред население на възраст 25-64 год. в зоните на програма СИНДИ-България'2007. *Българско списание за обществено здраве* 2010; 2(3): 3-34
 6. Murray CJ, Lopez AD. On the comparable quantification of health risks; lessons from the Global Burden of Disease Study. *Epidemiology* 1999; 10: 594-605.
 7. Lawes CM, Vander Hoorn S, Law MR, Elliott P, MacMahon S, Rodgers A. Blood pressure and the global burden of disease 2000. Part II: Estimates of attributable burden. *J Hypertens* 2006; 24: 423-430.
 8. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R.; Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: A meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. *Lancet* 2002; 360: 1903-1913.
 9. Redon J, Olsen MH, Cooper RS, Zurriaga O, Martinez-Beneito MA, Laurent S, et al. Stroke mortality trends from 1990 to 2006 in 39 countries from Europe and Central Asia: implications for control of high blood pressure. *Eur Heart J* 2011; 32:1424-1431.
 10. Botdorf J, Chaudhary K, Whaley-Connell A. Hypertension in cardiovascular and kidney disease. *Cardiorenal Med* 2011;1:183-192
 11. Levy D, Larson MG, Vasan RS, Kannel WB, Ho KK. The progression from hypertension to congestive heart failure. *JAMA* 1996;275:1557-1562.
 12. Go O, Rosendorff C. Hypertension and atrial fibrillation. *Curr Cardiol Rep* 2009; 11:430-435.
 13. Mancia G. Short- and long-term blood pressure variability: present and future. *Hypertension* 2012; 60: 512-517.
 14. Cuspidi C, Ochoa JE, Parati G. Seasonal variations in blood pressure: a complex phenomenon. *J Hypertens*. 2012; 30: 1315-1320.
 15. Sheth T, Nair C, Muller J, Yusuf S. Increased winter mortality from acute myocardial infarction and stroke: the effect of age. *J Am Coll Cardiol* 1999; 33: 1916-1919.
 16. van Rossum CT, Shipley MJ, Hemingway H, Grobbee DE, Mackenbach JP, Marmot MG. Seasonal variation in cause-specific mortality: are there high-risk groups? 25-year follow-up of civil servants from the first Whitehall study. *Int J Epidemiol* 2001; 30:1109-1116.
 17. Mackenbach JP, Kunst AE, Looman CW. Seasonal variation in mortality in The Netherlands. *J Epidemiol Community Health* 1992; 46: 261-265.
 18. Gerber Y, Jacobsen SJ, Killian JM, Weston SA, Roger VL. Seasonality and daily weather conditions in relation to myocardial infarction and sudden cardiac death in Olmsted County, Minnesota, 1979 to 2002. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 287-292.
 19. Green MS, Harari G, Kristal-Boneh E. Excess winter mortality from ischaemic heart disease and stroke during colder and warmer years in Israel. *Eur J Pub Health* 1994; 4: 3-11.
 20. Dilaveris P, Synetos A, Giannopoulos G, Gialafos E, Pantazis A, Stefanadis C. CLimate Impacts on Myocardial infarction deaths in the Athens Territory: the CLIMATE study. *Heart* 2006; 92(12): 1747-1751.
 21. Jakovljević D, Salomaa V, Sivenius J, Tamminen M, Sarti C, Salmi K, Kaarsalo E, Narva V, Immonen-Räihä P, Torppa J, Tuomilehto J. Seasonal variation in the occurrence of stroke in a Finnish adult population. The FINMONICA Stroke Register. Finnish Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. *Stroke* 1996; 27: 1774-1779.
 22. Shinkawa A, Ueda K, Hasuo Y, Kiyohara Y, Fujishima M. Seasonal variation in stroke incidence in Hisayama, Japan. *Stroke* 1990; 21:1262-1267.
 23. Wang Y, Levi CR, Attia JR, D'Este CA, Spratt N, Fisher J. Seasonal variation in stroke in the Hunter Region, Australia: a 5-year hospitalbased study, 1995-2000. *Stroke* 2003; 34:1144-1150.
 24. Frost L, Johnsen SP, Pedersen L, Husted S, Engholm G, Sørensen HT, et al. Seasonal variation in hospital discharge diagnosis of atrial fibrillation: A population-based study. *Epidemiology* 2002;13:211-215.
 25. Heller RF, Rose G, Tunstall-Pedoe HD, Christie DGS. Blood pressure measurement in the United Kingdom Heart Disease Prevention Project. *J Epidemiol Community Health* 1978; 32: 235-238.
 26. Thomas C, Wood GC, Langer RD, Stewart WF. Elevated blood pressure in primary care varies in relation to circadian and seasonal changes. *J Hum Hypertens* 2008; 22: 755-760.
 27. Brennan PJ, Greenberg G, Miall WE, et al. Seasonal variation in arterial blood pressure. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1982; 285: 919-923.
 28. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS, Ribak J. Body mass index is associated with differential seasonal change in ambulatory blood pressure levels. *Am J Hypertens* 1996; 9: 1179-1185.
 29. Lipsitz L, Allopataife I, Gagnon M, Kiely DK, Ser-rador JM. Enhanced vasoreactivity and its response to antihypertensive therapy in hypertensive elderly

- women. *Hypertension* 2006; 47(3): 377-383.
30. Alperovitch A, Lacombe JM, Hanon O, et al. Relationship between blood pressure and outdoor temperature in a large sample of elderly individuals: the Three-City study. *Arch Intern Med* 2009; 169: 75-80.
 31. Kimura T, Senda S, Masugata H, Yamagami A, Okuyama H, Kohno T, et al. Seasonal blood pressure variation and its relationship to environmental temperature in healthy elderly Japanese studied by home measurements. *Clin Exp Hypertens* 2010; 32(1): 8-12.
 32. Murakami S, Otsuka K, Kono T, Soyama A, et al. Impact of outdoor temperature on prewaking morning surge and nocturnal decline in blood pressure in a Japanese population. *Hypertens Res* 2011; 34: 70-73.
 33. Modesti PA, Morabito M, Bertolozzi I, Massetti L, Panci G, Lumachi C, et al. Weather-related changes in 24-h blood pressure profile: effects of age and implications for hypertension management. *Hypertension* 2006; 47:155-161.
 34. Barnett AG, Sans S, Salomaa V, Kuulasmaa K, Dobson AJ; WHO MONICA Project. The effect of temperature on systolic blood pressure. *Blood Press Monit* 2007; 12: 195-203.
 35. Lewington S, Li L, Sherlikera P, Guo Y, Millwood I, Bian Z, Whitlock G, et al. Seasonal variation in blood pressure and its relationship with outdoor temperature in 10 diverse regions of China: the China Kadoorie Biobank. *J Hypertens* 2012; 30:1383-1391.
 36. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS, Ribak J. Seasonal changes in ambulatory blood pressure in employees under different indoor temperatures. *Occupational and Environmental Medicine* 1995; 52(11): 715-721.
 37. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS. Seasonal change in 24-hour blood pressure and heart rate is greater among smokers than nonsmokers. *Hypertension* 1997; 30: 436-441.
 38. Stoeva K, Dokova K, Feschieva N, Kirov Ph, Yotov Y, Sanz A, Powles J. Seasonal variation in blood pressure and in proportions hypertensive in small but well-characterised urban and rural populations in Varna region. *Gac Sanit* 2003; 17: (Supl. 2): 163.
 39. Handler J. Seasonal variability of blood pressure in California. *J Clin Hypertens* 2011; 13: 856-860.
 40. Mori H, Ukai H, Yamamoto H, Saitou S, Hirao K, Yamauchi M, Umemura S. Current status of antihypertensive prescription and associated blood pressure control in Japan. *Hypertens Res* 2006; 29(3): 143-151.