Балонна дилатация на Евстахиевата тръба (Представяне на клинични случаи)

*Balloon Dilatation Eustachian Tuboplasty (BET)
(Case report)*

К. Джамбазов, Ст. Марков, А. Бешкова, К. Маджарова

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив

Dzambazov K, Markov S, Beskova A., Madzarova K.

UMHAT „St. George“ – Plovdiv

Резюме:

Увод: Дисфункцията на Евстахиевата тръба (обструктивен тип) представлява невъзможност за правилна вентилация на средното ухо през нея. Това е често срещано заболяване, от което страдат около 0,9% от възрастното население и до 40% от децата на възраст под 10 г. Така нарушената вентилация на *savum tympani* и *pros. mastoideus* може да доведе до развитие на рекурентен серозен отит, хроничен среден отит с ретракция на мембраната и дори с холестеатом, перфорация на тъпанчевата мембрана, деструкция на костите на средното ухо и др.

Цел: Използването на съвременен метод за лечение на дисфункцията на Евстахиевата тръба – балонна дилатация.

Материал и методи: Ние представяме два клинични случая на пациенти с диагностицирана дисфункция на Евстахиевата тръба, при които бе извършена за първи път в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив балонна дилатация на Евстахиева тръба.

Резултати: Пациентите бяха изписани с подобрене на оплакванията, но при извършените 30 дни след интервенцията контролни изследвания бяха диагностицирани резултати, близки до изходните.

Изводи: Балонната дилатация е нов микроинвазивен метод за лечение на дисфункцията на Евстахиевата тръба при пациенти, неповлияващи се от консервативно лечение.

Abstract:

Introduction: Eustachian tube dysfunction, particularly the obstructive type means inability for proper ventilation of the middle ear through it. This common disease affects 0,9% of adults and almost 40% of children up to age of 10 years. This lack of middle ear ventilation may lead to recurrent serous otitis media, chronic otitis media with retraction and even cholesteatoma, perforation of the tympanic membrane, ossicular erosion, etc.

Aim: To be used modern method for Eustachian tube dysfunction managing – balloon dilatation Eustachian tuboplasty (BET).

Material and Method: We present you the first two patients who underwent BET in UMHAT “St. George” Plovdiv.

Results: Patients were discharged with improvement of the symptoms but the control tests at the 30th day after the intervention showed results similar to that before BET.

Conclusions: Balloon dilatation Eustachian tuboplasty is a new micro invasive method for treatment of the Eustachian tube dysfunction in cases with no improvement of the conservative treatment.

Кратки анатомични данни

Евстахиевата тръба (*Tuba pharyngotympanica*) се отнася анатомично към структурите на средното ухо. Състои се от две части – хрущялна и костна, с обща дължина 31–38 мм.

Костната част на тръбата (*pars ossalis tubae Eustachii*) е с дължина 11–22 мм, с коса посока, водеща началото си от отвор в предната стена на *savum tympani*. Отворът е с размери 3,3/4,5 мм и води към канал (*semicanalis pro tuba auditiva*), който заема долната част на *canalis*

Short anatomical data

The Eustachian tube /*Tuba pharyngotympanica*/ anatomically is in a close relationship with the structures of the middle ear. The tube consists of two parts – cartilaginous and bony with total length 31-38mm.

The bony part of the tube /*pars ossalis tubae Eustachii*/ is 11-22mm long, with oblique direction, leading its beginning from an aperture in the front wall of the tympanic cavity. The size of the aperture is 3,3/4,5mm and leads into a canal /*semicana-*

musculotubarius. Костният канал постепенно намалява своя диаметър и в областта на istmus tubae достига 2 мм. Истмусът на Евстахиевата тръба е най-тесната ѝ част, а също така и мястото, където костният ѝ сегмент се съединява с хрущялния под ъгъл от 45 градуса.

lis pro tuba auditiva/, which occupies lower part of the canalis musculotubarius. The bony canal gradually decreases its diameter and in the region of the isthmus of the tube reaches 2mm. The isthmus of the Eustachian tube is its narrowest part and also is the point where its bony segment connects with the cartilaginous one under 45° angle.

Фиг. 1 и 2. Анатомия на Евстахиевата тръба
Fig. 1 and Fig. 2. Eustachian tube anatomy

Хрущялната част на тръбата заема латералните и 2/3 и е с дължина 24–26 мм. Хрущялът ѝ е прегънат на две, с по-дълга медиална и по-къса латерална част, поради което на напречен срез наподобява овчарска гег. Патоморфологично хрущялът на Евстахиевата тръба е от хиалинен тип със скелет от еластични и колагенни влакна. Фарингеалният край на хрущяла изпъква под лигавицата на епифаринкса, оформяйки torus tubarius, в центъра на който се намира цепковидният фарингеален отвор на Евстахиевата тръба (ostium pharyngeum tubae auditivae). Отворът се локализира на нивото на долна носна конха и е с размери, вариращи в широки граници (3–10 мм височина и 2–5 мм ширина).

Дисфункция на Евстахиевата тръба

Дисфункцията на Евстахиевата тръба представлява невъзможност за правилна вентилация на средното ухо през нея. Това е често срещано заболяване, от което страда около 0,9%² от възрастното население, със симптоми на слухова загуба от проводен тип, оталгия, тинитус и чувство за пълнота в ушите, които се обострят при промяна на атмосферното налягане. Диагнозата се поставя с помощта на анамнезата, отоскопичната находка, тимпанометричните показания, аудиометрията, образни изследвания (СТ), тубоманометричните показания и маньовърът на Валсалва¹. Дисфункция на Евстахиевата тръба се наблюдава при редица персистиращи заболя-

The cartilaginous part of the Eustachian tube occupies its lateral 2/3^{ts} and is 24-26mm long. The cartilage is bended into two with medial part longer than the lateral one, this is why its transverse cut resembles to a shepherd's crook. Pathomorfologически the Eustachian tube cartilage is a hyaline type with skeleton consisting of elastic and collagen fibers.

The pharyngeal end of the cartilage knobs out under the epipharyngeal mucosa forming torus tubarius, in the centre of which the pharyngeal aperture cleft of the Eustachian tube is situated/ostium pharyngeum tubae auditivae/. The aperture is localized at the level of lower nasal conch and its size varies a lot /3-10mm high and 2-5mm wide/.

Eustachian tube dysfunction

The Eustachian tube dysfunction is inability for a proper ventilation of the middle ear through it. It is a common disease of which suffers 0,9%² of the adults, with symptoms of conductive hearing loss, pain in the ears, tinnitus, ear obstruction feeling which intensifies when the air pressure changes. It is diagnosed with the help of anamnesis, otoscopic picture tympanometric and audiometric findings, CT scan, tubomanometry and Valsalva's maneuver¹. The Eustachian tube dysfunction can be observed in a cases with several persistent middle ear diseases, and in cases with „Otitis media with effusion” it is included in the pathogenesis of the

вания на средното ухо, като при „отитис медиа ексудатива” тя е включена и в патогенезата на заболяването^{3,4}. Докато при децата с напредване на възрастта и пълното развитие на Евстахиевата тръба често настъпва възстановяване на нейната функция, при 30–50% от възрастните пациенти, лекувани с консервативни средства (назални кортикостероиди, антихистамини и назални деконгестанти), получените резултати са незадоволителни^{5,6}. Следваща крачка при лечението на тези пациенти е парацентезата с поставянето за няколко месеца на вентилационна тръбичка (Grommet), което от своя страна крие риск от създаването на трайна перфорация на тъпанчевата мембрана.

Развитието на съвременната ендоскопска техника създаде нов метод за миниинвазивно лечение на дисфункцията на Евстахиевата тръба – балонната дилатация, която през последното десетилетие показва изключително добри резултати и се използва все по-широко⁷.

Балонна дилатация на Евстахиевата тръба – същност

Балонната дилатация на Евстахиевата тръба представлява е миниинвазивна процедура, представляваща поставяне на катетър с балон за определено време в хрущялната част на евстахиевата тръба, където в повечето от случаите с дисфункция се локализира проблема.

disease^{3,4}. While in children during their growing and Eustachian tube full development often full recovery of its function is observed, in adults in 30-50% of cases with conservative treatment /nasal steroids, antihistamines, and nasal decongestants/ the achieved results are unsatisfied^{5,6}. The next step in these cases is the tympanotomy with ventilation tube application (Grommet) for a few months, this at the other hand is hiding a risk permanent tympanic perforation to be formed.

The development of the modern endoscopic technique nowadays created a new method for a minimally invasive treatment of the Eustachian tube dysfunction – Balloon dilatation Eustachian tuboplasty, which through the last decade showed extremely good results and is used wider and wider⁷.

Balloon dilatation Eustachian tuboplasty(BET) – nature

Balloon dilatation Eustachian tuboplasty is a minimally invasive procedure which consists of laying a catheter with balloon for a certain time into the cartilaginous part of the Eustachian tube, where in most of the cases with dysfunction the problem is situated.

Фиг. 3. Водещ катетър за балонна дилатация на Евстахиева тръба
Fig. 3. Leading catheter for BET

Интервенцията може да бъде извършвана както под локална, така и под обща анестезия. След първоначална риноскопия и епифарингоскопия (0° и 30° ригиден ендоскоп) в орифициума на Евстахиевата тръба под ендоскопски контрол с 30° или 45° оптика се поставя водещ катетър с ъгъл от 30°, 45° или 70° (Фиг. 3). По водещия катетър през отвора на Евстахиевата тръба в нейния лумен се прокарва катетър с балон (Фиг. 4), докато той срещне умерена съпротива – обикновено на дълбочина 13–16 мм (Фиг. 5). Раздува се балонът с помощта на физиологичен

The intervention can be accomplished both under general and local anesthesia. After initial rhinoscopy and epipharyngoscopy /0° and 30° rigid endoscope/, in the pharyngeal aperture of the Eustachian tube under endoscopic control 30° or 45° optic a leading catheter with 30°, 45° or 70° angle is applied /Fig. 3/. Along the leading catheter through the Eustachian tube opening in its lumen catheter with a balloon is laid on /Fig. 4/ until it encountered moderate resistance – usually at depth 13-16mm /Fig. 5/. The balloon is inflated with physiological solution until reaching pressure 10-12 atmospheres

разтвор до достигане 10–12 атм. (Фиг. 6) . Катетърът с раздут балон престоява 30–120 секунди в лумена на Евстахиевата тръба, след което балонът се спада и катетърът се премахва.

/Fig. 6/. The catheter with inflated balloon stays at place 30-120 seconds, after that the balloon is subsided and the catheter is removed.

Фиг. 3. Водещ катетър за балонна дилатация на Евстахиева тръба
Fig. 3. Leading catheter for BET

Фиг. 4. Катетър с балон за дилатация на Евстахиева тръба и помпа за нагнетяване на налягането.
Fig. 4. catheter with balloon for dilatation of the Eustachian tube and pump for pressure augmentation.

Снимка 1. Поставен в орифициума на Евстахиевата тръба водещ катетър за балонна дилатация.

Picture 1. Leading catheter in the pharyngeal aperture of the Eustachian tube.

Fig 5.

Fig 6.

Фиг. 5 и 6. Поставен в лумена на Евстахиевата тръба катетър с балон за дилатация
Fig. 5 and Fig. 6. Catheter with balloon laid in the Eustachian tube lumen.

Резултатите показват, че балонната дилатация на Евстахиевата тръба може ефективно за подобри нейната функционалност. Процедурата се понася добре от пациентите и не се наблюдават тежки усложнения. Изключително важно за добър резултат от тази процедура е тя да се извършва след елиминация на всички фактори, влияещи на правилното функциониране на Евстахиевата тръба и средното ухо⁸.

В България методът е използван от проф. Меламед и доц. Петков за лечение на пациенти с епифарингеален карцином, позитивирали дисфункция на Евстахиевата тръба от обструктивен тип след проведена Т. Г. Т. (клиничните резултати от процедурата при този контингент не са добри). Доц. Цветков във ВМА – София използва балонната дилатация на Евстахиевата тръба от 2010 г. (изнесен доклад на тази тема на XI Белинов симпозиум). Проследените от него пациенти след дилатация на Евстахиевата тръба показват отлично повлияване на симптомите и силно подобрене на слуха – нормализиране на тимпанометриите и аудиометриите.

Клинични случаи

Представяме ви два клинични случая на пациенти с диагностицирана дисфункция на евстахиевата тръба, при които бе извършена за първи път в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив балонна дилатация на Евстахиева тръба.

Касае се за пациенти Д. И. 64 г. И.З. №58658 и Н. Б. 61 г. И. З. №58641 с дългогодишни оплаквания от намаление на слуха на двете уши, чувство за пълнота в ушите и тинитус. Двамата пациенти са провели консервативно лечение с локални и системни кортикостероиди и антихистамини, както и с локални деконгестанти без повлияване на оплакванията.

Клинична находка

Отоскопията показва тъпанчеви мембрани без възпалителни промени, с ограничена подвижност, разлят светлив рефлекс и прозиращ ексудат в *cum tympani*. И при двамата пациенти се извърши СТ на нос и околоносни кухини (без патологична находка), както и СТ на темпорални кости, които показаха хронични изменения в *cum tympani* и *proc. mastoideus*, запазена слухова верига и силно стеснен лумен на Евстахиевите тръби. Валсалва бе отрицателен и за двете уши. Аудиометричното изследване при

The results show that BET can effectively improve functionality of the Eustachian tube. The patients sustain well the procedure and no severe complications are observed. It is essential for the achieving good results, the procedure to be made after elimination of all factors influencing the proper functioning of the Eustachian tube and middle ear⁸.

In Bulgaria BET had been used by professor Melamed and assoc. professor Petkov in patients with epipharyngeal cancer for treatment their Eustachian tube dysfunction after radiotherapy application /clinical results from the procedure in this cases are not good/. Assoc. professor Tsvetkov in MMA Sofia uses balloon dilatation Eustachian tuboplasty since 2010 year Доц. Цветков във ВМА София използва балонната дилатация на евстахиевата тръба от 2010г. /official report upon BET et the XIth Belinov's Symposium/. The patients who had been followed up by him after the Eustachian tube dilatation showed excellent symptom affection and great hearing improvement – tympanometric and audiometric results become into normal.

Clinical Cases

We present two clinical cases with diagnosis “Eustachian tube dysfunction” in which BET was performed for the first time in UMHAT “St. George”.

The patients were D.I. 64 y old and N.B. 61y old with long term complains of hearing loss of both ears feeling of fullness in them and tinnitus. Both patients have been treated conservatively with local and system steroids and antihistamines, as well as with local decongestants without any effect upon the complains.

Clinical findings

The otoscopies showed tympanic membranes without inflammation changes, with restricted mobility, unclear light reflex and translucent exudation in the tympanic cavity. Both patients underwent nose and paranasal sinuses CT scan /no pathology found/ as well as temporal bones CT scan which showed chronic changes in the tympanic cavity and mastoid bone, intact ossicular chain and severely narrowed lumen of the Eustachian tubes. Valsalva's test was negative for both ears. The audiometric test of D.I. showed bilateral, symmetric conductive

пациента Д. И. показва двустранно симетрично намаление на слуха от проведен тип за честотите до 3000Hz и чисто приемно намаление на слуха над тази честота (Фиг. 7 и Фиг. 8).

hearing loss for the frequencies up to 3000Hz and pure sensorineural hearing loss above that frequency /Fig. 7 and Fig. 8/.

Фиг. 7.

Fig. 7

Фиг. 8.

Fig. 8

Тимпанометрията на Д. И. показва плоска крива (Тип В) за дясно ухо и изместена към отрицателните налягания тимпанометрична крива (Тип С) за ляво ухо (Фиг. 9 и Фиг. 10).

The right ear tympanogram of D.I. is plate /Type B/ and the left one is dislocated to the negative pressure values /Type C/, /Fig. 9 and Fig. 10/.

Фиг. 9.

Fig. 9

Фиг. 10.

Fig. 10

Аудиометричното изследване при пациента Н.Б. показва двустранно симетрично намаление на слуха от комбиниран тип (Фиг. 11 и Фиг. 12).

The audiometric test of N.B. showed bilateral, symmetric, combined hearing loss /Fig. 11 and Fig. 12/.

Фиг. 11.

Fig. 11

Фиг. 12.

Fig. 12

Тимпанометрията на Н. Б. показва плоска крива (Тип В) за дясно ухо и изместена към отрицателните налягания тимпанометрична крива (Тип С) за ляво ухо (Фиг. 13 и Фиг. 14).

The right ear tympanogram of N.B. is plate /Type B/ and the left one is dislocated to the negative pressure values /Type C/, /Fig. 13 and Fig. 14/.

Фиг. 13.

Fig. 13

Фиг. 14.

Fig. 14

Кратко описание на извършената оперативна процедура

След щателна предоперативна подготовка под обща интубационна анестезия и при двамата болни се постави в орифициума на Евстасиевата тръба под ендоскопски контрол с 30° оптика водещият катетър с ъгъл от 45°, след което по него, през отвора на Евстасиевата тръба в нейния лумен се прокара катетър с балон. Разду се балонът с помощта на физиологичен разтвор до достигане на 10 атм. Катетърът с раздут балон престоя 120 секунди в лумена на Евстасиевата тръба, след което балонът се спадна и катетърът се премахна. Процедурата бе повторена и за другата Евстасиева тръба на болните. По време на престоя на катетъра с раздут балон ясно се видя през ендоскопа изтичането на задържания серозен секрет от *cavum tympani*, като най-демонстративно бе по време на дилатацията на дясната Евстасиева тръба на Д. И. Гладък следоперативен период.

Short description of the performed surgery

After an accurate preoperative preparation under general anesthesia in both cases under endoscopic control /30° optic/ in the pharyngeal opening of the Eustachian tube the leading catheter with 45° angle was placed, after that along the leading catheter through the Eustachian tube opening in its lumen catheter with a balloon was laid on. The balloon was inflated with physiological solution until reaching pressure 10 atmospheres. The catheter with inflated balloon stayed at place 120 seconds, after that the balloon was subsided and the catheter was removed. The procedure was repeated for the other patients' Eustachian tube. Until the period when the balloon was inflated it was clearly seen through the endoscope the leakage of the secretion held in the tympanic cavity, and most pointedly it was by the time of the right Eustachian tube dilatation of D.I. Postoperative period with no complications.

В деня след балонната дилатация пациентите Д.И. и Н.Б. бяха изписани без оплаквания, в добро общо състояние, като съобщиха за субективно подобрене на слуха и редукция на тинитуса.

Тридесет дни след процедурата бяха извършени контролни аудиометрични и тимпанометрични изследвания на слуха, които за съжаление показваха резултати близки, до изходните, и за двамата пациенти.

Обсъждане и изводи

Балонната дилатация е нов микроинвазивен метод за лечение на дисфункцията на Евстахиевата тръба при пациенти, неповлияващи се от консервативно лечение. Той е поредната нова методика, станала възможна благодарение на развитието на ендоназалната техника и методите на ендоназалната хирургия. Успеваемостта на процедурата зависи не само от безупречното ѝ изпълнение, но и от правилния подбор на пациентите за нея. Сравнително високата цена на необходимите за извършването ѝ консумативи е основна пречка за превръщането ѝ в рутинен метод за лечение на тубарната дисфункция от обструктивен тип.

The day after BET the patients D.I and N.B. were discharged in good condition without any complains, and they informed about subjective hearing improvement and tinnitus reduction.

Thirty days after the procedure control audiometric and tympanometric hearing test were made. In both cases they showed unfortunately results similar to those before BET execution.

Discussion and conclusions

Balloon dilatation Eustachian tuboplasty is new micro invasive method for Eustachian tube dysfunction treatment, in cases with no effect from conservative treatment. It is a new method which becomes possible because of the development of the endonasal technique and methods of the endonasal surgery. The procedure success depends not only on its perfect execution but also depends on the proper patients selection for it. The comparatively high prize of the materials necessary for its execution is the main obstacle for it to become a routine method for Eustachian tube dysfunction treatment.

Литературна справка:

1. Miller, B.J. & Elhassan, H.A. (2013); Balloon dilatation of the Eustachian tube: an evidence-based review of case series for those considering its use; Clinical Otolaryngology, 38, 525–532.
2. Browning G.G. & Gatehouse S. (1992); The prevalence of middle ear disease in the adult British population.; Clinical Otolaryngology, 17, 317–321.
3. Yüçetürk A.V., Unlü H.H., Okumus_ M. et al. (1997) 'The evaluation of eustachian tube function in patients with chronic otitis media'. Clin. Otolaryngol. Allied Sci. 22, 449–452
4. Bluestone C.D. (1996) 'Pathogenesis of otitis media: role of the eustachian tube'. Pediatr. Infect. Dis. J. 15, 281–291
5. Ludman H. (1988) Mawson's Diseases of the Ear London: Edward Arnold.
6. Yung M.W. (1997) 'Retraction of the pars tensa-long-term results of surgical treatment'. Clin. Otolaryngol. 22, 323–326
7. Kivekäs I, Chao WC, Faquin W, Hollowell M, Silvola J, Rasooly T, Poe D. Histopathology of balloon-dilation eustachian tuboplasty. Laryngoscope. 2014 Aug 22. doi: 10.1002/lary.24894
8. Silvola J, Kivekäs I, Poe DS. Balloon Dilation of the Cartilaginous Portion of the Eustachian Tube. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Apr 4; 151(1): 125–130.

References:

1. Miller, B.J. & Elhassan, H.A. (2013); Balloon dilatation of the Eustachian tube: an evidence-based review of case series for those considering its use; Clinical Otolaryngology, 38, 525–532.
2. Browning G.G. & Gatehouse S. (1992); The prevalence of middle ear disease in the adult British population.; Clinical Otolaryngology, 17, 317–321.
3. YÜcetÜrk A.V., Unlü H.H., Okumus_ M. et al. (1997) 'The evaluation of eustachian tube function in patients with chronic otitis media'. Clin. Otolaryngol. Allied Sci. 22, 449–452
4. Bluestone C.D. (1996) 'Pathogenesis of otitis media: role of the eustachian tube'. Pediatr. Infect. Dis. J. 15, 281–291
5. Ludman H. (1988) Mawson's Diseases of the Ear London: Edward Arnold.
6. Yung M.W. (1997) 'Retraction of the pars tensa-long-term results of surgical treatment'. Clin. Otolaryngol. 22, 323–326
7. Kivekäs I, Chao WC, Faquin W, Hollowell M, Silvola J, Rasooly T, Poe D. Histopathology of balloon-dilation eustachian tuboplasty. Laryngoscope. 2014 Aug 22. doi: 10.1002/lary.24894
8. Silvola J, Kivekäs I, Poe DS. Balloon Dilation of the Cartilaginous Portion of the Eustachian Tube. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Apr 4; 151(1): 125–130.

Авторски колектив:

Проф. д-р Карен Джамбазов д.м.н.

Д-р Стоян Марков д.м.

Д-р Анка Бешикова

Д-р Калина Маджарова

Клиника по УНГ-болести

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив

Автор за контакти:

Д-р Стоян Марков д.м.

Адрес: Пловдив ул. „Чернишевски“ № 48

Тел: 0889 331347;

E-mail: Stoyan_bgus2002@yahoo.com