Чужди тела в дихателните пътища – диагностични предизвикателства

Foreign Bodies in Respiratory Tract – Diagnostic Challenges

Д. Конов, С. Йорданов, М. Генадиева

УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ“, ЕАД – София, Клиника по УНГ-болести
УМБАЛ „Александровска“ – София, Катедра по патология

Konov D, Yordanov S, Genadieva M

UMBAL “Tzaritza Ioanna – ISUL” EAD, Sofia, ENT Department
UMBAL “Alexandrovskia”, Sofia, Department of Pathology

Резюме

Чуждите тела в дихателните пътища представляват и в наши дни сериозно диагностично и терапевтично предизвикателство. Те могат да се изиявят с остра драматична симптоматика с прояви на диспнея, асфиксия и смърт или да протичат скрито със седмици и месеци, съпроводени с редица усложнения. Независимо от съвременните постижения на медицината поставянето на ранна диагноза много често се оказва трудно. Според повечето автори само наличието на анамнестични данни за инцидент е достатъчно основание за бронхоскопия.

Abstract

Foreign bodies in the airways pose a serious diagnostic and therapeutic challenge even nowadays. The initiating symptoms can present acute and dramatic with dyspnea, asphyxia or even death or they can develop over weeks to months, leading to a whole array of complications. Even in the modern era of high technology, the early diagnosis can still be quite difficult. According to most of the contemporary authors even the positive medical history by itself should be a reasonable cause for bronchoscopy.

Чуждите тела в дихателните пътища представляват и в наши дни сериозно диагностично и терапевтично предизвикателство. Те могат да се изиявят с остра драматична симптоматика с прояви на диспнея, асфиксия и смърт или да протичат скрито със седмици и месеци, съпроводени с редица усложнения. Късната диагноза е свързана със значително повишена честота на компликациите и затова е важно при най-малко съмнение да извършим необходимите диагностични процедури за поставяне на ранна диагноза. Чуждите тела в дихателните пътища са с най-висока честота в детската възраст. Значителен дял в етиологията на този проблем има здравната култура на населението. Много често причина за инцидентите е даването на неподходяща за съответната възраст храна. Превенцията си остава най-добрата терапия, което включва обучение на родителите и ограничаване на достъпа до опасни предмети, както и стриктни производствени норми за играчките и принадлежностите за деца. Това поражда необходимостта от широка обществена информационна кампания. В тази насока в Израел след проведена мащабна образователна дейност е констатиран 35% спад на инцидентите през 1983г. в сравнение с 1981г. Независимо от това тази патология продължава да заема сериозен дял в спешните състояния.

Най-често инцидентите с аспирирани чужди тела се наблюдават в диапазона 0-3 години. Това може да се свърже с липсата на зъби и лошата координация

на гълтането в тази възраст. Освен това децата често са активни по време на хранене и изследват предметите, като ги пъхат в устата. По наши наблюдения масова е и практиката родителите да хранят децата си с храна, неподходяща за съответната възраст.

Позицията на чуждото тяло се определя от неговите характеристики и позицията на болния по време на инцидента. Ларинксът и трахеята се засягат най-рядко с изключение на възрастта до 1 година, но пък са с най-голям риск от летален изход. Бронхите са предпочитаната локализация, като десният се засяга малко по-често. При малките деца обаче тази разлика ляво-дясно не е така изразена и дори може да липсва. Не са редки и случаите с двустранни и множествени чужди тела, което изисква задължителна ревизия след екстракцията на чуждото тяло.

Локализацията на чуждите тела в ларинкса е най-рядка (около 2-12%) с изключение на децата до 1 година. Въпреки това тя крие риск от най-сериозните усложнения и се причислява към състоянията с изключителна спешност. Тежката диспнея до степен на апнея може да се предизвика от пълна обструкция, ларингоспазм и прогресиращ ларингеален оток. Типични прояви са дисфонията и афонията, а диспнеята е от инспираторен тип. Това може да се сбърка с характерния за детската възраст субхордален ларингит. В тежките случаи се стига до респираторен арест и смърт.

Чуждите тела в трахеята се наблюдават при 3-12% от случаите. Симптомите са подобни на ларингеалните, но с бифазен стридор, суха трахеална кашлица с „плясък на развято знаме“, който понякога се чува без стетоскоп. Всяко движение може да доведе до нов пристъп на асфиксия.

В 80-90% чуждите тела се локализируют в бронхите. При 65% се наблюдава триадата от кашлица, свиркане и отслабено дишане. В 95% се проявява поне един от симптомите. В някои от случаите бронхиалното чуждо тяло може да причини дихателна недостатъчност в резултат на нарастващ обем при тези от растителен произход, оток от настъпващата възпалителна реакция, както и от миграция на чуждото тяло към незасегнатата половина. Най-често попадат в десен главен бронх поради по-големия му диаметър и по правия ъгъл, под който се отделя.

Клинични прояви

Може да разграничим 3 клинични фази при аспирация на чуждо тяло: начална (първа) фаза с изявиени клинични прояви, втора асимптомна фаза и трета фаза на компликациите.

Най-често при настъпил инцидент родителите или възрастните, грижещи се за детето и станали свидетели, описват през първата фаза внезапно задущаване, напъни за повръщане с последваща интензивна кашлица. През втората асимптомна фаза чуждото тяло се фиксира в дисталните отдели на дихателните пътища, като състоянието може бързо да се подобри и дори клиничните прояви напълно да изчезнат. Заедно с това трябва да се има предвид, че както физикалният статус, така и рентгеновата находка могат да бъдат напълно нормални. Ето защо поставянето на диагнозата може да се окаже истинско предизвикателство. Според много автори дори и само анамнестичните данни за настъпил инцидент със задавяне с чуждо тяло е достатъчно основание да пристъпим към диагностична бронхоскопия. Linegar и колеги съобщават за 45% открити чужди тела при бронхоскопия в случаи на позитивни данни от анамнезата и негативна рентгенова находка и физикален статус. Те също така съобщават, че при неубедителни анамнестични данни за инцидент едва 9,5% от ендоскопиите са били позитивни за чуждо тяло. Cifci и колеги смятат, че анамнезата е най-чувствителното (91%), точно (84%) и специфично (46%) диагностично средство. От една страна, колкото по-кратък е периодът от аспирирането до екстракцията, толкова по-вероятно е да имаме негативна находка от образното изследване и белодробния статус, от друга страна пък ранната диагноза значително намалява риска от настъпването на късни усложнения, като ателектази, бронхиектазии и рецидивиращи белодробни инфекции. Не бива да забравяме обаче, че бронхоскопията не е безопасна манипулация, още повече при толкова малки деца. Така че решението на този проблем до ден-днешен си остава трудно, без сигурни критерии и до голяма степен зависи от опита на специалиста. Заболеваемостта и смъртността нарастват значително в ранна детска възраст поради тесните дихателни пътища и незрелите защитни механизми. Според Black, Johnson и колеги 78% от загиналите при аспириране на чуждо тяло са от 2 месеца до 4-годишна възраст.

Физикален статус

Пациентът с чуждо тяло в дихателните пътища може да е в добро общо състояние, почти без симптоми или да е в състояние на тежка животозастрашаваща дихателна недостатъчност и дистрес. Най-общо физикалният статус е с ниска специфичност и относително висока чувствителност по отношение на диагнозата. Аускултаторната находка може да включва отслабено дишане, асиметрия на двете гръдни половини, сухи свиркащи хрипове, които на по-късен етап с възникването на възпалителна реакция могат да станат влажни. При наличие на емфизем имаме хиперсонорен перкуторен тон, а при ателектаза и пневмонични инфилтрати – притъпен. Не са редки и двустранните чужди тела, които още повече комплицират находката. Отрицателният физикален статус не изключва диагнозата, но поради сравнително високата чувствителност позитивната находка е важна за определяне необходимостта от диагностична бронхоскопия. Рентгенографията е задължителна за поставяне на диагнозата. Рентгенографската находка зависи от размера, локализацията, продължителността на престоя и вида на чуждото тяло. В повечето случаи чуждите тела в дихателните пътища са рентгеннегативни. Ето защо тук разчитаме повече на индиректни белези. За тяхното позитивиране обаче са необходими поне няколко часа. При наличие на вентилен механизъм засегнатата половина е с белези на емфизем. При пълна обструкция с резорбция на въздуха се оформя огнище на ателектаза. В тези случаи при рентгеноскопия може да се наблюдава „люлеене“ на медиастиnum. Ателектазата и пневмонията са обикновено късни находки (след 24-ти час). И тук както и при физикалния статус чувствителността е ниска и негативната находка не изключва диагнозата. Над половината от трахеалните и $\frac{1}{4}$ от бронхиалните чужди тела могат да се съпровождат от отрицателна рентгенова находка. Докладваната от различни автори чувствителност от 49% до 88% и специфичност от 9% до 71% показва, че доказателствената стойност на метода силно зависи от опита на рентгенолога. Може да кажем, че в сравнение с анамнезата и физикалния статус, рентгенографската находка е с най-малка сензитивност. Късна диагноза може да наблюдаваме при подценяване на инцидента, както от страна на болния или родителите, така и от страна на лекаря. Това

води до възпалителна реакция и формиране на грануляционна тъкан около чуждото тяло. Често пъти първият симптом, поради който се търси лекарска помощ, е признак на вече настъпило усложнение. Не са редки случаите, при които пациентът се лекува за персистиращ фебрилитет, астма или рецидивиращи пневмонии за дълъг период от време, което силно затруднява диагностиката и отстраняването. Ето защо дори и при съмнителна анамнеза, физикален статус и находка от образното изследване се пристъпва към бронхоскопия, която ни дава окончателната диагноза и лечение. Но както вече споменахме, бронхоскопията крие риск от сериозни компликации, включително и смърт, дори и изпълнявана от опитен бронхоскопист. Ето защо от особена важност е откриването на сигурен диагностичен метод, който да намали необходимостта от ненужни бронхоскопии. Виртуалната бронхоскопия е неинвазивен метод, позволяващ ни да огледаме отвътре трахеята и големите бронхи чрез триизмерна реконструкция на КТ образа. Извършването ѝ при малките деца обаче изисква обща анестезия и ги излага на сравнително високо лъчево натоварване.

Sameh Ibrahim Sersar и колектив правят проучване за 10-годишен период от 1995-2005 г., в което са включени 3300 пациенти, на които е проведена бронхоскопия по повод съмнение за аспирация на чуждо тяло. Разделят болните на 3 групи: група I – болни с негативна бронхоскопия (1135), при които чуждо тяло не е открито, група II – давност на чуждото тяло до 1 седмица от инцидента (1900), група III – давност над 1 седмица (265). Те установяват, че при пациентите с късна диагноза значително нараства делът на малката възрастова група до 3-годишна възраст и особено на тези под 1 година. Освен това при 75.52% от пациентите в група II има анамnestични данни за инцидент със задавяне с чуждо тяло, докато при група III – само при 6,79%. При късно диагностицираните нараства значително процентът на болните с клинични данни за пневмония и ателектази. Обратно, делът на нормални рентгенографии намалява при група III от 60% на около 34% и е най-висок при група I. Установено е също, че компликациите, като необратим арест, увреда на главните дихателни пътища, баротравма, също и необходимостта от ребронхоскопии и бронхотомии нарастват с увеличаване на престоя на чуждото тяло. По-

голямата част от чуждите тела са от растителен произход, като слънчогледови семки, фъстъци и други. Ядките и семената поради високото съдържание на мазнини предизвикват изразена възпалителна реакция и формиране на гранулации, което с удължаването на престоя води до рецидивиращи, упорити на лечение пневмонии, ателектази, бронхиектазии и абсцеси.

От всичко това можем да заключим, че ясна анамнеза за инцидент и суспектна рентгенова

находка са двата главни критерия за извършването на трахеобронхоскопия с диагностична и терапевтична цел. Повечето автори както и ние смятаме, че при съмнение за чуждо тяло е по-добре да се извърши една негативна трахеобронхоскопия, отколкото да се пропусне правилната диагноза и да се поеме рискът от сериозни компликации при забавяне на екстракцията.

Библиография:

1. Divisi D et al. "Foreign Bodies Aspirated in Children: Role of Bronchoscopy" Thorac Cardiovasc Surg 2007; 55: 249–252
2. Francesca Foltran et al., Foreign bodies in the airways: A meta-analysis of published papers, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 76S (2012) S12–S19
3. Sameh Ibrahim Sersar et al., Inhaled foreign bodies: management according to early or late presentation, European Journal of Cardiothoracic Surgery 28 (2005) 369–374
4. Hugo Rodríguez et al., Management of foreign bodies in the airway and oesophagus, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 76S (2012) S84–S91
5. Antônio José Maria Cataneo & Daniele Cristina Cataneo & Raul Lopes Ruiz Jr, Management of tracheobronchial foreign body in children, Pediatr Surg Int (2008) 24:151–156 DOI 10.1007/s00383-007-2046-z
6. Cesare Cutrone et al., The complimentary role of diagnostic and therapeutic endoscopy in foreign body aspiration in children, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (2011) 1481–1485
7. Maren Tomaske, Andreas C. Gerber, Sergio Stockera, Markus Weissb, Tracheobronchial foreign body aspiration in children – diagnostic value of symptoms and signs, SWISS MED WKLY 2006; 136: 533–538