Тежки възпалителни заболявания в областта на главата и шията

Severe inflammatory diseases in the head and neck

Цв. Тончев

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Медицински университет – Варна

Tsvetan Tonchev

Abstract:

We present our experience in the treatment of severe inflammatory disease of the head and neck in seventeen patients for ten-year period. In the concept of severe inflammatory diseases we include the cases with engagement of more than two anatomic spaces of the head and neck determining severity score two and more by Flynn. The effectiveness of the surgical treatment in these patients and the usage of hyperbaric oxygenation in addition to the complex treatment is appreciated. Concluded is made that surgical treatment is still a leading method and other treatment modalities contribute to the rapid development of reparative processes, shortening the period of recovery of patients, but they are not an alternative.

Key words: Severe Inflammatory Diseases; Surgical Treatment; Head and Neck, Hyperbaric Oxygenation.

Резюме:

Представен е опитът при лечението на тежко протичащи възпалителни заболявания в областта на главата и шията за десетгодишен период при седемнадесет болни. В понятието тежко протичащи възпалителни заболявания включваме случаите с ангажиране на повече от две анатомични ложи на главата и шията, определящи степен на тежест над втора по Flynn. Оценена е ефективността от прилагането на хирургичното лечение при тези болни, както и използването на хипербарна оксигенация като допълнение към комплексното лечение. Направен е изводът, че хирургичното лечение си остава водещо и прилагането на други лечебни методи способстват за бързото развитие на репаративните процеси, съкращавайки периода на възстановяване на болните, но не са алтернатива.

Ключови думи: тежки възпалителни заболявания; хирургично лечение; глава и шия, хипербарна оксигенация.

Увод

Лечението на болните с тежки възпалителни заболявания в областта на главата и шията продължава да ангажира вниманието на специалистите, занимаващи се с тези проблеми.⁷ Това се обуславя от честотата на тази патология, която се увеличава, както и от развитието на тежки усложнения често на фона на нарастващата част от населението с алергични заболявания, при които изборът на антибиотично лечение може да бъде сериозен проблем.^{1, 5, 7, 8} В същото време одонтогенните флегмони са от най-често разпространените възпалителни заболявания в областта на главата и шията, като характерът на тяхното протичане в последните години значително се промени и се появи тенденция към бързото им разпространение към съседни анатомични пространства.^{2, 4, 6, 10-12} По този начин се развиват флегмони на няколко топографоанатомични области, в резултат на което все по-често се наблюдават случаи на генерализиране на инфекцията с развитие на сепсис, инфекциозно-токсичен шок, тромбози на лицевите вени и на мозъчните синуси и на мозъчни абсцеси.^{1, 4, 6} Както и преди, най-често и в повечето случаи фатално усложнение си остава медиастинитът.^{6, 7, 10} По тази причина разработването и апробирането на нови алгоритми за лечение, в основата на които лежат класическите схеми, допълнени и в комбинация с методи, използващи физически фактори, се явява разумната комбинация за постигане на оптимално добри резултати при комплексното лечение на тези болни. Перспективна в този план се явява хипербарната оксигенация (ХБО), прилагана в алгоритъма на комплексното противовъзпалително лечение.^{3, 9, 13} Въздействието на хипербарния кислород все повече се използва в клиниката на различни по своя етиология, характер и протичане заболявания. Трудно може да се посочи област в медицината, в която ХБО

с по-голям или по-малък успех да не са се използвали като самостоятелен метод за лечение или съвместно с други терапевтични средства.⁹

Материал и методи

Основната цел на нашето изследване е да се оцени ефективността от прилагането на комплексното хирургично лечение при болните с тежки възпалителни заболявания в областта на главата и шията и използването на хипербарна оксигенация. Представен е нашият опит при лечението на тежко

протичащи възпалителни заболявания в областта на лицето и шията за периода между 1998 и 2008 година в ББАЛ – Варна и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. На ретроспективен анализ по документи са подложени 17 болни с ангажиране на повече от две анатомични ложи на лицето и шията, позволяващи определяне на степен на тежест над втора по Flynn (Фиг. 1).⁵

Фиг. 1. Предоперативен вид на болните

Основни задачи, които бяха дискутирани при всеки един пациент, бяха:

- ♦ Определяне тежестта на инфекцията.
- ♦ Оценка на защитните сили на организма.
- ♦ Вземане решение за мястото на лечение.
- ♦ Обем на хирургичното лечение.
- ♦ Поддържащо медикаментозно лечение.
- ♦ Избор и започване на антибиотично лечение.
- ♦ Съобразяване на антибиотичното лечение.
- ♦ Динамична оценка на състоянието на пациента.

При тежките възпалителни процеси в областта на лицето и шията комплексът от лечебни мероприятия е разработен с отчитане спектъра на микрофлората и включва основно хирургично лечение. То се състои в извършването на широки инцизии за откриване на ангажираните и суспектни анатомични ложи, лаваж с кислородна вода и антисептични разтвори и дрениране на възпалителните огнища. Най-често те се оставяха отворени за ревизия и предотвратяване на възможността за създаване на ретенционни ложи, които да водят до персистиране и разпространение на инфекцията

(Фиг. 2). Началното антибиотично лечение при постъпването включваше използването на цефалоспорин втора или трета генерация, аминоглюкозид и метронидазол до получаване на резултат от микробиологичното изследване. Известно е, че хипербарният кислород мобилизира много дезинтоксикационни системи в организма чрез инхибиране на образуването на токсични метаболити, въздейства на анаеробните микроорганизми, водейки до тяхната гибел, стимулира биосинтезата в организма, а оттам и репаративните и регенеративните процеси. Сеансите хипербарна оксигенация се осъществяваха в двуетсечна многоместна барокамера. Честотата на процедурите и тяхното общо количество при определяне курса на лечение се назначаваха индивидуално в зависимост от тежестта на заболяването и характера на местните изменения. Най-често използваният режим на оксигенация беше при 2 атм. за 30 минути с време на компресия 10-15 минути и на декомпресия 10-15 минути. Сеансите се провеждаха ежедневно с курсова доза 10 дни, като някои автори съобщават за курсови дози до тридесет дни и различни оксигенационни режими.⁹

Фиг. 2. Интраоперативен изглед след отваряне на ангажираните анатомични ложи

Резултати

На анализ бяха подложени резултатите от лечението при всичките болни от изследваната група при използването на този подход. Като текущи критерии за ефективността на лечението послужиха клиничните и клинично-лабораторни данни, микробиологични, биохимични и хистологични резултати. Крайният резултат от лечението беше оценен въз основа на болничния престой, който се движеше между седем и шестдесет дни (средно седемнадесет дни, Фиг. 3). От изследваната група при един болен лечението завърши с exitus, в резултат на генерализиран сепсис и локална прогресия на възпалителния процес интракраниално. Това съставлява 5,88% от изследваната група, което се доближава до резултатите, публикувани от други автори.^{3, 11} Използването на хипербарна оксигенация оказва сумарно положително въздействие при лечение на болните с тежки възпалителни процеси в областта на главата и шията. Въз основа на получените данни от клиничното наблюдение при нашите болни и протичането на възпалителния процес при тях се потвърждава положителния ефект от приложението на хипербарната оксигенация в комплексното лечение на тези заболявания.

Фиг. 3. Следоперативен вид на болен

Дискусия

Комплексното лечение на тежките възпалителни процеси на главата и шията е „conditio sine qua non” за благоприятен изход при всеки един клиничен случай. Използването на ХБО като част от това лечение оказва активно въздействие на редица важни фактори в хомеостазата на макроорганизма и заедно с това променя биологичните свойства на микроорганизмите. Голяма роля в патогенезата на гноения процес принадлежи на хипоксията във

възпалителното огнище, обусловена от намалената тъканна концентрация на кислорода, за сметка на влошената микроциркулация в областта на поражението. При това в значителна степен се изменя усвояването на кислорода в тъканите, което води до промяна на обменните процеси, в частност процесите на метаболизма. Според нас е важно и актуално в бъдеще да се направи детайлен сравнителен анализ на действията на този физически метод, а също така и да се обоснове неговото използване при отчитане на специфичното му въздействие при различните фази на възпалителния процес. Проведените изследвания показват, че използването на хипербарна оксигенация в комплексното лечение на болните с тежки възпалителни процеси на главата и шията значително ускорява регенерацията на увредените тъкани. Това се постига чрез подобряване оксигенацията на тъканите, оказващ бактериостатичен ефект, нормализиране на микроциркулацията в огнището на възпалението и

повишаване равнището на метаболизма на клетките и тъканите както локално, така и в организма като цяло. Описаният метод на физическо въздействие, използван в комплексното лечение на болните с тежки възпалителни процеси на главата и шията, ускорява репаративните процеси в определени граници.

Заклучение

Изходът от лечението на болните с тежки възпалителни процеси в областта на главата и шията зависи основно от правилната преценка и своевременността на хирургичното лечение. Прилагането на останалите лечебни методи, включително хипербарната оксигенация, способства за бързото освобождаване на тъканите от гнойно-некротичните маси и по-бързото развитие на репаративните процеси, като по този начин се съкращава периодът на възстановяване на болните, но те не могат да бъдат алтернатива.

Литература:

1. Boscolo-Rizzo P, et al. Deep neck infections: a constant challenge. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec.* 2006; 68(5): 259-65.
2. Chatter-Cora D, et al. Necrotizing fasciitis of the head and neck: a report of two patients and review. *Head Neck* 2002; 24(5): 497-501.
3. Fanzca D, D. Doolette. Hyperbaric Oxygen Treatment and Survival From Necrotizing Soft Tissue Infection. *Arch Surg.* 2004; 139: 1339-1345
4. Fenton C, et al. Necrotizing fasciitis of the face: a rare but dangerous complication of dental infection. *J Can Dent Assoc.* 2004; 70(9): 611-5.
5. Flynn T, et al. Predicting length of hospital stay and penicillin failure in severe odontogenic infections. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1999; 28 Suppl 1: 48.
6. Furst I, P. Ersil, M. Caminiti, A rare complication of tooth abscess-Ludwig's angina and mediastinitis. *J Can Dent Assoc.* 2001; 67(6): 324-7.
7. Huang T, et al. Deep neck infection: analysis of 185 cases. *Head Neck.* 2004; 26(10): 854-60.
8. Krishnan V, J. Johnson, J. Helfrick, Management of maxillofacial infections: a review of 50 cases. *J Oral Maxillofac Surg* 1993; 51(8): 868-73.
9. Ramaswami R, W. Lo, Use of hyperbaric oxygen therapy in Hong Kong. *HKMJ* 2000; 6: 108-12
10. Sethi D, R. Stanley. Deep neck abscesses – changing trends. *J Laryngology Otol* 1994; 108(2): 138-43.
11. Suehara A, et al. Deep neck infection: analysis of 80 cases. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2008 Mar-Apr; 74(2): 253-9.
12. Umeda M, et al. Necrotizing fasciitis caused by dental infection: a retrospective analysis of 9 cases and a review of the literature. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2003; 95(3): 283-90.
13. Urschel J, Necrotizing soft tissue infections. *Postgrad Med J* 1999; 75: 645-649

Адрес за кореспонденция:

Д-р Цветан Тончев, д.м.
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия
Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" – Варна
Факултет по дентална медицина
ул. "Марин Дринов" № 55
9002 Варна
България
e-mail: mfstonchev@mu-varna.bg

Corresponding author:

Dr. Tsvetan Tonchev, DMD, PhD
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Faculty of Dental Medicine
Prof. Paraskev Stojanov Medical University of Varna
55 Marin Drinov street
BG-9002 Varna
Bulgaria
E-mail: mfstonchev@mu-varna.bg