РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УВЕИТИ

С. Николаева, Б. Ненчева

Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет – Варна

Резюме. Увеитите са една от основните причини за очна заболяемост и слепота. В световен мащаб увеитите се свързват с 5 до 10 % от зрителните увреждания, като 35 % от пациентите, при които е диагностицирано заболяването имат значителна загуба на зрението, а някои достигат и до пълна слепота. Увеитът е често срещано, заплашващо зрението възпалително очно заболяване и включва множество хетерогенни клинични прояви. Разпространението на различни видове увеит зависи от множество фактори, като възраст, пол, раса, географско разпространение, влияние на околната среда, генетични и социални фактори. Целта е въз основа на проведените литературен обзор да се представят рисковите фактори за развитие на увеити. В базите данни PubMed, Scisearch и Scopus беше проведено обширно изследване на научните статии, като бяха използвани следните ключови думи: увеити, епидемиология, честота, рискови фактори, разпространение. Въз основа на получените резултати е направен синтезиран преглед на рисковите фактори и разпространението на увеитите. Повечето проучвания, свързани с увеитите, са проведени в развитите страни. В тези проучвания честотата на заболяването е между 17 и 52 на 100 000 души годишно, а разпространението е 38–714 случая на 100 000 население. До 25 % от случаите на слепота в развиващите се страни са свързани с увеитите. При диагностицирането на типа увеит е необходимо да се вземат предвид локализацията, началото на заболяването, продължителността и клиничният ход. Познаването на регионалните модели и рисковите фактори за заболяването е от съществено значение. По-подробната класификация на увеита с установяването на единни диагностични критерии и проспективни проучвания на базата на населението оказва съществено влияние върху епидемиологичните изследвания и клиничната практика.

Ключови думи: увеит, рискови фактори, честота, класификация

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF UVEITIS

S. Nikolaeva, B. Nencheva

Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Medical University – Varna

Abstract. Uveitis is one of the main causes of eye disease and blindness. Worldwide, uveitis is associated with 5 to 10% of visual impairments, with 35% of patients diagnosed with the disease having significant vision loss and some reaching complete blindness. Uveitis is a common, eye-threatening inflammatory eye disease and involves a number of heterogeneous clinical formations. The prevalence of different types of uveitis depends on many factors, such as age, sex, race, geographical distribution, environmental influences, genetics and social habits. The aim is to present the risk factors for the development of uveitis based on the literature review. Material and methods: An extensive study of scientific articles was conducted in the PubMed, ScienceDirect and Scopus databases, using the following keywords: uveitis, epidemiology, frequency, risk factors, prevalence. Based on the obtained results, a synthesized review of the risk factors and the prevalence of uveitis was made. Most studies related to uveitis have been conducted in developed countries. In these studies, the incidence was between 17 and 52 per 100,000 people per year, and the prevalence was 38-714 cases per 100,000 population. Up to 25% of cases of blindness in developing countries are associated with uveitis. When diagnosing the type of uveitis, it is necessary to take into account the location, onset of the disease, duration and clinical course. Conclusion: Knowledge of regional patterns and risk factors for the disease is essential. The more detailed classification of uveitis with the establishment of uniform diagnostic criteria and prospective population-based studies have a significant impact on epidemiological studies and clinical practice.

Key words: uveitis, risk factors, frequency, classification

ВЪВЕДЕНИЕ

Увеитите са една от основните причини за очна заболяемост и слепота. В световен мащаб увеитите се свързват с 5 до 10% от зрителните увреждания, като 35% от пациентите, при които е диагностицирано заболяването, имат значителна загуба на зрението, а някои достигат и до пълна слепота [18, 43]. Разпространението и фенотипната експресия на различни видове увеит зависят от възрастта, пола, расата, географското разпределение, влиянието на околната среда, генетичните фактори и социалните навици [10, 65]. В световен мащаб съществуват значителен брой изследвания, описани в научни статии, които са фокусирани върху разпространението и рисковите фактори за развитие на увеитите.

Целта е въз основа на проведения литературен обзор да се представят рисковите фактори за развитие на увеити.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В базите данни PubMed, ScienceDirect и Scopus беше проведено обширно изследване на научните статии, като бяха използвани следните ключови думи: увеити, епидемиология, честота, рискови фактори, разпространение. Въз основа на получените резултати е направен синтезиран преглед на рисковите фактори и разпространението на увеитите.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Повечето проучвания, свързани с увеитите, са проведени в развитите страни [39]. В тези проучвания честотата на заболяването е между 17 и 52 на 100 хил. души годишно, а разпространението е 38-714 случая на 100 хил. население [16, 17, 22, 46, 60, 64]. До 25 % от случаите на слепота в развиващите се страни са свързани с увеитите [43].

С термина „увеити“ са описани възпаленията на ириса, цилиарното тяло и хориоидеята. Увеитите могат да бъдат причинени от инфекциозни или неинфекциозни агенти, както и от системни заболявания. Увеитите се класифицират според анатомични критерии за локализация на възпалението (предни, интермедиерни, хориоретинити (задни) и панувеити),

в зависимост от клиничното протичане (остри, хронични, рецидивиращи), според етиологията (инфекциозни, неинфекциозни), хистопатологията (грануломатозни, негрануломатозни) и разположението (едностранен, двустранен). При диагностицирането на типа увеит е необходимо да се вземат предвид локализацията, началото на заболяването, продължителността и клиничният ход [62].

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Тютюнопушенето се свързва с всички видове увеити [35]. Авторите установяват, че рискът пушачите да развият очно възпаление е 2,2 (1,7-3,0; $p < 0,001$) пъти по-голям в сравнение с пациентите, които никога не са пушили. От друга страна, авторите установяват, че тютюнопушенето е свързано с всички анатомични подтипове увеити, като рискът за развитието на преден увеит е 1,7 (1.2-2.4, $p = 0.002$), за интермедиерен увеит е 2,7 (1.4-5.6, $p = 0.005$), за заден увеит е 3,2 (1.3-7.9, $p = 0.014$) и за панувеит е 3,9 (2.4-6.1, $p < 0.001$). Комбинирането на кистозен макулен едем с панувеит и интермедиерен увеит се увеличава значително при пациентите, които пушат – съответно 8,0 (3,3-19,5, $p < 0,001$) и 8,4 (2,5-28,8, $p = 0.001$). Пациентите с анамнеза за тютюнопушене имат по-висок риск от развитие на инфекциозен увеит (OR 4,5 (2,3-9,0, $p < 0.001$), отколкото неинфекциозен (OR 2,1 (1,6-2,8, $p < 0.001$).

Стрес. Данните от изследване на влиянието на стреса за развитие на увеит или рецидив са доста противоречиви. Няколко автори правят оценка на стреса при увеит, предимно при преден увеит [8, 36, 37, 42]. Ролята на стреса за развитие на пептична язва, хипертония и сърдечни заболявания вече е доказана [47]. Счита се, че емоционалният стрес играе важна роля при над 50% от заболяванията [4] и много пациенти свързват рецидивите на увеит със стресови житейски събития. Duke-Elder изследва връзката между увеита и психологическите фактори [19].

Някои автори установяват връзка между психологическия стрес и свързания с ювенилния идиопатичен артрит увеит [55, 56]. Secchi et al. [55] са прегледали 60 пациенти

с идиопатичен преден увеит, 15 с рецидив (средна възраст 43.3 г, М:Ж-1.1:1) и 45 с овладян увеит (средна възраст 40.9 г, М:Ж-1.1:1) и 60 контроли. Използвайки скалата на Paykel за оценка на жизнените събития, количествено и качествено през предходните 12 месеца, авторите установяват, че няма статистическа разлика между двете групи пациенти с увеит и контролите. Не се доказва и статистически значима разлика при проверка на симптомите, въпреки че се установява по-висок резултат в групата на пациентите с рецидивиращ увеит.

Друго изследване с 48 пациенти (М:Ж – 1,5:2) на рецидивиращ увеит (преден и заден) [56] дава следните данни: в 37.5% от случаите авторът открива, че стресът има пряко влияние върху развитието или прогресията на увеит. В 16.6% се предполага, че остро напрежение в междуличностните взаимоотношения е свързано с рецидивирание на заболяването. Авторът стига до заключението, че в някои случаи стресът провокира развитието на рецидиви, като се свързват по-скоро с острите епизоди на стреса, отколкото с хроничния продължаващ стрес. В тази посока важно за бъдещите изследвания е разграничаването между остри и хронични стресови жизнени събития, тъй като субектите могат да бъдат по-податливи към заболяване след хроничен стрес, отколкото при остър епизод.

Kumar et al. извършват биохимична оценка при пациенти с увеит и съобщават за определена връзка между стресовия индекс и биоамините (катехоламини, адреналин и норадреналин) и нивата на хистамин в кръвта. Използвана е модифицирана скала за оценка за 6-те месеца, предхождащи появата на симптомите, и е отчетена определена корелация между резултатите от стреса и увеита [33].

Резултатите от проведено кръстосано, контролирано проучване показват, че увеитът е свързан с по-голям психически стрес в сравнение с лицата без увеит, измерен с въпросника PSS-10, но въпреки това няма статистически значима разлика в резултатите. Многофакторен анализ установява, че женският пол (OR = 4.0; 95% CI, 1.6-6.5; P = 0.002), анамнеза за депресия (OR = 3.8; 95% CI, 0.8-6.8; P = 0.02), заден или панувеит (OR

= 2.6; 95% CI, 0.8-4.4; P = 0.006) и имуномодулиращата терапия (OR = 2.5; 95% CI, -0.3-5.2; P = 0.08) са свързани с повишени резултати на PSS-10 [5].

Две други проучвания на пациенти с рецидивиращ остър преден увеит доказват, че пациентите с увеит имат по-високи нива на психически стрес, по-ниско качество на живот, специфично за заболяването, и по-малко разнообразие в стратегиите за справяне [8, 20]. Въпреки че изследванията са ограничени от малкия брой на извадките, като цяло те подкрепят идеята, че психическият стрес може да играе роля при пациентите с увеит. Въпреки това не е ясно дали стресът е отключващ фактор за активност на увеита, или резултат от допълнителните тревоги, които идват с хроничното заболяване, нарушаващо зрението. Изследванията не могат да дадат отговор на въпроса дали стресът отключва, или е резултат от увеита. Но редица открития допринасят за нарастващия брой доказателства, които предполагат, че пациентите с увеит имат по-високи нива на стрес в сравнение с лицата без това заболяване.

Възраст. Увеитът може да се прояви във всяка възрастова група. Въпреки това най-често са засегнати лица на възраст 20-50 години, като в докладите варират от 60% до 80% от общия брой на регистрираните случаи на увеит [52, 53]. Средната възраст при началото на заболяването е сравнително ниска – приблизително 40 години [49]. Като цяло, увеитът е рядкост при деца на възраст под 10 години и възрастни над 70 години [43].

Специфични видове увеит могат да засегнат определени възрастови групи. Характерни примери са свързаният с ювенилния идиопатичен артрит увеит, който е често срещан при деца [23]; HLA-B27 се свързва с остър преден увеит при лица на средна възраст около 35 години [18, 49, 65]; хориоретинопатията се среща при лица на средна възраст 50 години [21]; и маскиращи синдроми на увеит като например вътреочен лимфом сред възрастното население [11, 44].

Увеитът при децата се среща рядко и съответства на 5-16% от всички случаи на увеит [15, 29, 53, 54, 57]. Годишната честота на увеит при деца, регистрирани в европейските

страни, е докладвана като значително по-ниска (4 на 100 000 годишно) в сравнение с възрастните и разпространението му е 10 пъти по-ниско (28 на 100 000) [53]. Увеитът в детска възраст е свързан с тенденция за хроничност, висок процент на усложнения и последващо тежко зрително увреждане. Около една трета от децата с увеит страдат от тежка загуба на зрението [15, 54, 57].

Пол. В развитите страни мъжете и жените са приблизително еднакво засегнати от увеит [38, 45, 52]. Напоследък изследването на увеита показва, че няма значителни разлики в честотата на разпространението между половете, но по-висока честота е наблюдавана при жените [1]. Проучвания от САЩ, Европа и Япония не показват ясна разлика между половете в общия брой, като 30-60% от случаите се наблюдават при жените [6, 12, 14, 26, 31, 49, 50, 58, 59, 66].

Полът оказва влияние върху вида на увеита. Характерни примери за превес на мъжкия пол са HLA-B27-асоциираният преден увеит (3:1) [52] и сифилитичният увеит при пациенти с HIV (главно поради разпространението на HIV при мъжете) [18]. От друга страна, примерите за превес на женски пол включват хроничния преден увеит, свързан с ЮИА (5:1) [23] и МС при младите и жените на средна възраст [34], което предполага ясен ефект на пола. Липса на каквато и да е предилекция към пола се наблюдава при синдрома на увеит на Фукс [65]. За разлика от данните на развитите страни мъжете са по-често засегнати в развиващите се страни в съотношение 2:1. Социално-икономическите условия могат да поставят мъжете в по-голям риск от някои видове инфекциозни увеити като лептоспироза [48, 49]. Въпреки това проучване от Индия подсказва, че това е не е точно, тъй като в развиващите се страни мъжете обикновено търсят медицинска помощ по-често от жените [49]. Диференцирането на възпалителната реакция по пол е интензивно изследвано. Установено е, че жените имат различен имунен отговор към травмата и инфекцията в сравнение с мъжете.

Географско местоположение. Честотата на увеита проявява подчертани географски разлики, които се дължат на екологични, ге-

нетични, хистопатологични и социално-икономически фактори. Токсоплазмозата е основна причина за задния увеит в световен мащаб, с изразени географски несъответствия по отношение на разпространението му. Алиментарните и социалните фактори повлияват географското разнообразие от тази инфекция [65]. Онхоцерциазата е ендемична в някои райони на Африка и Централна и Южна Америка [13]. Тя представлява най-често срещаната етиология за панувеит в Сиера Леоне, известна като „речна слепота“. Генетичните фактори също допринасят за географската променливост на разпространението на увеитите.

Хормонален дисбаланс. Изследва се връзката между половите хормони и микробната инфекция. Освен това увеитите с автоимунна етиология са по-чести при жените. Хормоналните, хромозомните и екологичните фактори влияят на активирането на различни имунни клетки, които играят важна роля при инфекциозни и автоимунни заболявания [9].

Доказано е, че естрогените увеличават автоимунния отговор, докато андрогените го потискат. Конкретно, последните данни показват, че естрогените имат дозозависим ефект върху автоимунитета. Ниските нива предизвикват стимулиране, докато повишените нива причиняват инхибиране на автоимунния отговор [68]. Понастоящем в световен мащаб се извършват молекулярни изследвания, за да се изясни сложната роля на пола върху имунитета и автоимунитета.

Генетични фактори. Доказана е връзката между началото на увеита и HLA-A19 (OR: 2.87; 95% CI: 1.35-36.87; $p < 0.001$), HLA-B22 (OR: 4.51; 95% CI: 1.36-22.97; $p < 0.001$) и HLA-DR9 (OR: 2.33; 95% CI: 1.07-08.92; $p < 0.001$). Както се очаква, HLA-DR1 (OR: 0.13; 95% CI: 0.04-00.27; $p < 0.001$) има протективна роля за развитието на увеита. Авторите не откриват значителна връзка между алелите на HLA и тежестта на увеита [70].

Болестта на Behçet може да причини преден увеит, заден увеит (понякога и двата вида едновременно) и/или васкулит на ретината. Възпалителното очно заболяване може да се развие рано в хода на болестта и да доведе до тежка загуба на зрението в 20% от случаите.

Знае се, че болестта на Behçet е разпространена по пътя на коприната, който се простира от Източна Азия до Средиземноморието [67, 69]. Най-често се установява в Турция, но има голямо разпространение и в Япония, Корея, Китай, Иран, Ирак и Саудитска Арабия [69]. В страните от Северна Америка и Северна Европа разпространението е много по-ниско [7]. Болестта настъпва обикновено през втората и четвъртата декада от живота и често е спорадична [3, 28, 30, 61, 63]. Болестта на Behçet все още остава болест с неизвестна етиология. Някои автори свързват HLA-B51 (особено HLA-B5101) с болестта на Behçet, като предполагат генетично предразположение, но действителната връзка не е добре дефинирана [40]. Други автори докладват фамилна обремененост, но е рядкост да се срещне засягането при няколко членове на едно семейство, дори когато много членове на семейството имат гена HLA-B51. Този факт прави присъствието само на HLA-B51 незначителен фактор. Тъй като едни и същи клинични прояви са открити в различни етнически групи, се предполага, че факторите на околната среда вероятно също играят роля заедно с генетичната предразположеност [41].

Синдром на Vogt-Koyanagi-Harada засяга предимно испанци или японци, носещи HLA-DR1 и HLA-DR4 алели. Честотата му варира в зависимост от географското местоположение и етническата принадлежност. Заболяването засяга предимно тъмно пигментирани раси. В Япония представлява 6,8% до 9,2% от случаите с увеит [2], в САЩ е около 1-4%. По-голямата част от откритите случаи са около второто и петото десетилетие от живота. В някои изследвания се съобщава, че жените са по-засегнати от мъжете, но това варира в зависимост от изследваната популация. Има връзка с HLA-DR1 и HLA-DR4 (субтип 0405) [25, 27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на проведените анализи на различни проучвания може да се илюстрира хетерогенността в епидемиологичните характеристики на увеита в зависимост от множество фактори. От друга страна, се установяват

и промени в епидемиологичните модели на увеит във времето. През последните години диагностичните методи в офталмологията се променят значително, което оказва влияние върху честотата на специфични увеитни находки [24]. Въпреки това промените в честотата и разпространението на различните етиологии на увеита могат да бъдат причислени към възможни промени в истинската честота на заболяването във връзка с увеличената способност за ранна диагностика в съвременната практика. В развиващите се страни, диагностицирането на увеита се затруднява поради ограничената наличност на специфични диагностични методи, което води до по-голяма честота на предполагаемия идиопатичен увеит [65]. Например в Сиера Леоне не са налице HLA типизиране, тъканна биопсия и рентгенография на гръдния кош и следователно потвърждението на диагнозата не може да бъде извършено [51]. В допълнение, етиологиите, които са много редки, могат лесно да се пренебрегнат.

При оценката на епидемиологичните данни за увеита трябва да се имат предвид множество важни фактори. Повечето от анкетите представят резултати от центровете за третична грижа, които не обхващат цялото население, и това води до неточни данни за разпространението на заболяването. Проучвания от третични центрове съобщават за по-голямо разпространение на заден увеит и панувеит. За разлика от това предният увеит се съобщава по-често в общата практика [38]. В тази посока за проследяване на истинската честота на разпространението на увеита е необходимо да се провеждат изследвания на цялата популация. Проспективните проучвания също се считат за по-точни и надеждни [39]. Тъй като броят на проучванията, проведени в развитите страни, е значително по-голям в сравнение с няколко проучвания, проведени в Африка и/или съсредоточени върху чернокожите пациенти, е трудно да се сравняват данните между расите. Големите движения на населението, наблюдавани през последните години, или миграция от селски към градски региони, или международна имиграция, също играят роля в моделите на разпространение на заболяването във

времето [32]. Социално-икономическите навици също оказват влияние върху регистрираната честота. В развиващите се страни мъжете са склонни да търсят медицинска помощ по-често, отколкото жените, което води до повишено регистриране на увеита при мъжете [49], а от друга страна, те имат професии, които са често рискови за развитие на инфекции, свързани с паразити.

Въвеждането на анатомичната класификация на увеита доведе до еднаквост при описанието на заболяването и улеснява сравнителните анализи между проучванията. Въвеждането на универсални диагностични критерии може допълнително да подобри степента на откриване на основна етиология и да се намали честотата на увеита, обозначен като идиопатичен.

Промените на моделите на увеит през годините подчертават необходимостта от задълбочени и непрекъснати епидемиологични изследвания. Познаването на рисковите фактори и ключовите регионални различия в геоандрофенотипизацията на болестта и подобряването на диагностичните възможности ще намали честотата на това заплашващо зрението заболяване.

КНИГОПИС

1. Acharya NR, Tham VM, Esterberg E, et al. Incidence and prevalence of uveitis results from the Pacific Ocular Inflammation Study. *JAMA Ophthalmol.* 2013;131:1405-1412.
2. Agarwal, A. Gass's Atlas of Macular Diseases, 5th Ed. China, Saunders; 2012:998-1002.
3. Akpolat T, Koç Y, Yeniay I, et al. Familial Behçet's disease. *Eur J Med* 1992; 1:391.
4. Atkinson RL. Conflict and stress. In: Introduction to psychology. Harcourt Brace Jovanovich International Edition. (eighth edition), 2000:438-49.
5. Berlinberg EJ, Gonzales JA, Doan T, Acharya NR. Association Between Noninfectious Uveitis and Psychological Stress. *JAMA Ophthalmol.* Published online December 06, 2018, 137(2):199-205. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.5893.
6. Biswas J, Narain S, Das D, Ganesh SK. Pattern of uveitis in a referral uveitis clinic in India. *Int Ophthalmol.* 1996-1997;20:223-228.
7. Calamia KT, Wilson FC, Icen M, et al. Epidemiology and clinical characteristics of Behçet's disease in the US: a population-based study. *Arthritis Rheum* 2009; 61:600.

8. Carrim ZI, Ahmed TY, Taguri AH. The relationship between stress and acute anterior uveitis. *Acta Ophthalmol Scand.* 2006;84(6):795-798. doi:10.1111/j.1600-0420.2006.00752.x.
9. Chan CC, Goldstein DA, Davis JL, et al. Gender and uveitis. *J Ophthalmol.* 2014;2014:818070.
10. Chang JH, Wakefield D. Uveitis: a global perspective. *Ocul Immunol Inflamm.* 2002;10:263-279.
11. Chatzistefanou K, Markomichelakis NN, Christen W, et al. Characteristics of uveitis presenting for the first time in the elderly. *Ophthalmology.* 1998;105:347-352.
12. Chung YM, Yeh TS, Liu JH. Endogenous uveitis in Chinese: an analysis of 240 cases in a uveitis clinic. *Jpn J Ophthalmol.* 1988;32:64-69.
13. Cooper PJ, Proano R, Beltran C, et al. Onchocerciasis in Ecuador: ocular findings in onchocerca volvulus infected individuals. *Br J Ophthalmol.* 1995;79:157-162.
14. Couto C, Merlo JL. Epidemiological study of patients with uveitis in Buenos Aires, Argentina. In: Dernouchamps JP, Verougstraete C, Caspers-Velu L, et al., eds. Recent Advances in Uveitis: Proceedings of the Third International Symposium on Uveitis, Brussels, Belgium, 1992. Amsterdam: Kugler; 1993:171-174.
15. Cunningham ET Jr. Uveitis in children. *Ocul Immunol Inflamm.* 2000;8:251-261.
16. Dandona L, Dandona R, John RK, et al. Population based assessment of uveitis in an urban population in southern India. *Br J Ophthalmol.* 2000;84:706-709.
17. Darrell RW, Wagener HP, Kurland LT. Epidemiology of uveitis. *Arch Ophthalmol.* 1962;68:502-515.
18. De Smet MD, Taylor SR, Bodaghi B, et al. Understanding uveitis: the impact of research on visual outcomes. *Prog Retin Eye Res.* 2011;30:452-470.
19. Duke-Elder S. Diseases of the uveal tract. In: System of ophthalmology. London: Henry Kimpton, 1966;Vol IX:85-8.
20. Franke GH, Schütte E, Heiligenhaus A. [Rehabilitation-psychological aspects of uveitis]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2005;55(2): 65-71. doi:10.1055/s-2004-828504.
21. Gasch AT, Smith JA, Whitcup SM. Birdshot retinochoroidopathy. *Br J Ophthalmol.* 1999;83:241-249.
22. Gritz DC, Wong IG. Incidence and prevalence of uveitis in Northern California: the Northern California Epidemiology of Uveitis Study. *Ophthalmology.* 2004;111:491-500.
23. Heiligenhaus A, Minden K, Föll D, et al. Uveitis in juvenile idiopathic arthritis. *Dtsch Arztebl Int.* 2015;112:92-100.
24. Henderly DE, Genstler AJ, Smith RE, et al. Changing pattern of uveitis. *Am J Ophthalmol.* 1987;103:131-136.

25. Huang J., Gaudio P. Ocular Inflammatory Disease and Uveitis Manuel: Diagnosis and Treatment, 1st Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
26. Islam SM, Tabbara KF. Causes of uveitis at The eye center in Saudi Arabia: a retrospective review. *Ophthalmic Epidemiol.* 2002;9:239-249.
27. Kanski J., Bowling B. Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach, 7th Ed. El Sevier Saunders; 2011.
28. Karıncaoglu Y, Borlu M, Toker SC, et al. Demographic and clinical properties of juvenile-onset Behçet's disease: A controlled multicenter study. *J Am Acad Dermatol* 2008; 58:579.
29. Kimura SJ, Hogan MJ. Uveitis in children: analysis of 274 cases. *Trans Am Ophthalmol Soc.* 1964;62:173-192.
30. Koné-Paut I, Geisler I, Wechsler B, et al. Familial aggregation in Behçet's disease: high frequency in siblings and parents of pediatric probands. *J Pediatr* 1999; 135:89.
31. Kotake S, Furudate N, Sasamoto Y, et al. Characteristics of endogenous uveitis in Hokkaido, Japan. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 1997;235:5-9.
32. Kötter I, Vonthein R, Müller CA, et al. Behçet's disease in patients of German and Turkish origin living in Germany: a comparative analysis. *J Rheumatol.* 2004;31:133-139.
33. Kumar A, Nema HV, Thakur V. Stress and uveitis. *Ann Ophthalmol.* 1981, 13:1077-1080.
34. Laroni A, Calabrese M, Perini P, et al. Multiple sclerosis and autoimmune diseases: epidemiology and HLA- DR association in North-east Italy. *J Neurol.* 2006;253:636-639.
35. Lin P, Loh AR, Margolis TP, Acharya NR. Cigarette smoking as a risk factor for uveitis. *Ophthalmology.* 2010, 117 (3): 585-90. doi:10.1016/j.ophtha.2009.08.011.
36. Maca SM, Schiesser AW, Sobala A, et al. Distress, depression and coping in HLA-B27-associated anterior uveitis with focus on gender differences. *Br J Ophthalmol.* 2011;95(5):699-704. doi:10.1136/bjo.2009.174839.
37. Maca SM, Wagner J, Weingessel B, Vécsei-Marlovits PV, Gruber K, Schiesser AW. Acute anterior uveitis is associated with depression and reduction of general health. *Br J Ophthalmol.* 2013; 97(3):333-337. doi:10.1136/bjophthalmol-2012-302304.
38. McCannel CA, Holland GN, Helm CJ, et al. Causes of uveitis in the general practice of ophthalmology. UCLA Community Based Uveitis Study Group. *Am J Ophthalmol.* 1996;121:35-46.
39. Miserocchi E, Fogliato G, Modorati G, et al. Review on the worldwide epidemiology of uveitis. *Eur J Ophthalmol.* 2013;23:705-717.
40. Mizuki N, et al. Behçet's disease associated with one of the HLA-B51 subantigens, HLA-B* 5101. *Am J Ophthalmol.* 1993;116:406-409.
41. Moarefi M, Abdelaziz M, Rostamizadeh M, Ahmad B. Behçet disease. Practicing Ophthalmologists Learning System, 2017-2019. American Academy of Ophthalmology. Retina/Vitreous. https://eyewiki.aao.org/Behcet%27s_Disease.
42. Mulholland B, Marks M, Lightman SL. Anterior uveitis and its relation to stress. *Br J Ophthalmol.* 2000;84(10):1121-1124. doi:10.1136/bjo.84.10.1121.
43. Muñoz-Fernández S, Martín-Mola E. Uveitis. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2006;20:487-505.
44. Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Ozdal PC, Yazici A, et al. Clinical and demographic characteristics of patients with uveitis starting later in life. *Ocul Immunol Inflamm.* 2015;23:304-310.
45. Oruc S, Kaplan AD, Galen M, et al. Uveitis referral pattern in a Midwest University Eye Center. *Ocul Immunol Inflamm.* 2003;11:287-298.
46. Päivönsalo-Hietanen T, Tuominen J, Vaahtoranta Lehtonen H, et al. Incidence and prevalence of different uveitis entities in Finland. *Acta Ophthalmol Scand.* 1997;75:76-81.
47. Rahe RH, Bennett C. Recent life changes and coronary heart disease in Finland. *Am J Psychiatry.* 1973, 110:1212.
48. Rathinam SR. Leptospirosis. *Curr Opin Ophthalmol.* 2002;13:381-386.
49. Rathinam SR, Namperumalsamy P. Global variation and pattern changes in epidemiology of uveitis. *Indian J Ophthalmol.* 2007;55:173-183.
50. Rodriguez A, Calonge M, Pedroza-Seres M, et al. Referral patterns of uveitis in a tertiary eye care center. *Arch Ophthalmol.* 1996;114:593-599.
51. Ronday MJ, Stilma JS, Barbe RF, et al. Aetiology of uveitis in Sierra Leone, west Africa. *Br J Ophthalmol.* 1996;80:956-961.
52. Rothova A, Buitenhuis HJ, Meenken C, et al. Uveitis and systemic disease. *Br J Ophthalmol.* 1992;76:137-141.
53. Saari KM, Päivönsalo-Hietanen T, Vaahtoranta-Lehtonen H, et al. Epidemiology of endogenous uveitis in southwestern Finland. *Acta Ophthalmol Scand.* 1995;73:345-349.
54. Sauberan DP. Pediatric uveitis. *Int Ophthalmol Clin.* 2010;50:73-85.
55. Secchi AG, Magni G, Tognon MS, et al. A psychosomatic approach to idiopathic recurrences of anterior uveitis. *Am J Ophthalmol.* 1987, 104:174-178.
56. Sen DK. Endogenous uveitis in relation to stress – a clinical study. *Eye Ear Nose and Throat Monthly.* 1971, 50:108-110.
57. Smith JA, Mackensen F, Sen HN, et al. Epidemiology and course of disease in childhood uveitis. *Ophthalmology.* 2009;116:1544-1551.
58. Smit RL, Baarsma GS, de Vries J. Classification of 750 consecutive uveitis patients in the Rotterdam Eye Hospital. *Int Ophthalmol.* 1993;17:71-76.

59. Soheilian M, Heidari K, Yazdani S, et al. Patterns of uveitis in a tertiary eye care center in Iran. *Ocul Immunol Inflamm.* 2004;12:297-310.
60. Tran VT, Auer C, Guex-Crosier Y, et al. Epidemiology of uveitis in Switzerland. *Ocul Immunol Inflamm.* 1994;2:169-176.
61. Treudler R, Orfanos CE, Zouboulis CC. Twenty-eight cases of juvenile-onset Adamantiades-Behçet disease in Germany. *Dermatology* 1999; 199:15.
62. Trusko B, Thorne J, Jabs D, et al. Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Project. The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Project. Development of a clinical evidence base utilizing informatics tools and techniques. *Methods Inf Med.* 2013;52:259-265, S1-S6.
63. Tugal-Tutkun I, Urgancioglu M. Childhood-onset uveitis in Behçet disease: a descriptive study of 36 cases. *Am J Ophthalmol* 2003; 136:1114.
64. Vadot E, Barth E, Billet P. Epidemiology of uveitis: preliminary results of a prospective study in the Savoy. In: Saari KM, ed. *Uveitis Update*. Amsterdam: Elsevier Science; 1984:13-17.
65. Wakefield D, Chang JH. Epidemiology of Uveitis. *Int Ophthalmol Clin.* 2005;45:1-13.
66. Weiner A, Ben Ezra D. Clinical patterns and associated conditions in chronic uveitis. *Am J Ophthalmol.* 1991;112:151-158.
67. Yazici H, Fresko I, Yurdakul S. Behçet's syndrome: disease manifestations, management, and advances in treatment. *Nat Clin Pract Rheumatol* 2007; 3:148.
68. Yeung IY, Popp NA, Chan CC. The role of sex in uveitis and ocular inflammation. *Int Ophthalmol Clin.* 2015;55:111-131.
69. Yurdakul S, Hamuryudan V, Yazici H. Behçet syndrome. *Curr Opin Rheumatol* 2004; 16:38.
70. Zulian F, Martini G, Falcini F, et al. Early predictors of severe course of uveitis in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis. *J Rheumatol.* 2002;29(11):2446-2453.