СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В МАКУЛАТА ПРИ ДИАБЕТИЦИ

Златарова З., Е. Христова, Вл. Йоцова

Key words: *diabetic retinopathy, central macular thickness, neurofibrillar layer*

Диабетната ретинопатия е едно от най-често срещаните усложнения на захарния диабет. Тя е водеща причина за слепота сред работоспособното население на възраст между 20 и 60г. в икономически добре развитите страни. Появата ѝ и началните стадии от развитието ѝ са безсимптомни, което прави изключително важно активното ѝ търсене и навременното започване на лечение, за да се предотврати загубата на зрение.

Като основен момент в патогенезата на диабетната ретинопатия се разглежда предизвиканата от хипергликемията микроангиопатия, проявяваща се с промени в стените на капилярите и нарушаване на вътрешната кръвно-ретинна бариера (1). Редица проучвания в последните години обаче, съобщават, че загубата на нервни клетки предхожда микросъдовите промени (2,3,4). Експериментални изследвания с животни установяват апоптоза на нервни и глиални клетки в ретината в много ранни стадии на диабетната ретинопатия (5,6). С помощта на електро-ретинография и микропериметрия са установени функционални нарушения при болни с начална диабетна ретинопатия или дори преди появата на микроаневризми и хеморагии (7,8). Всяка загуба на нервни клетки или глия би довела до изтъняване на ретината (9).

Катедра по очни болести и зрителни науки, МУ-Варна, СБОБАЛ-Варна

Macular structural changes in diabetic patients

Zlatarova Z., E. Hristova, V. Yocova

Purpose: To determine whether diabetes causes changes of central macular thickness (CMT), nerve fiber layer (NFL) and ganglion cell-inner plexiform layer (GCIPL) thickness, and to investigate the possible relationship between this changes and duration of diabetes mellitus and glycemic control (HbA1c). **Materials and Methods:** Mean CMT, NFL and GCIPL thickness of 60 eyes without DR and 60 eyes with minimal DR was calculated following automated segmentation of 3D-Topcon 2000 OCT images of 85 diabetic patients. A control group of 60 eyes of 60 age-matched healthy volunteers was included for comparison. To determine the correlation between CMT, inner retinal layers thickness and diabetes duration, and HbA1c levels, a Pearson correlation analysis was used. **Results:** The mean CMT, NFL and GCIPL thickness in eyes without DR was 210,08µm, 34,75µm and 68,55µm, respectively; in eyes with minimal DR was 214,2µm, 35,63µm and 70,83µm, respectively and in healthy eyes was 214,73µm, 35,53µm and 69,35µm, respectively. There was no significant difference in CMT, NFL and GCIPL thickness between studied groups. There was positive significant correlation between CMT and diabetes duration ($p=0.005$) and negative significant correlation between GCIPL thickness and diabetes duration ($p=0.013$), and between NFL+GCIPL and diabetes duration ($p=0.04$). No relationship between CMT, NFL and GCIPL thicknesses and HbA1c was present. **Conclusions:** Our study demonstrated absence of difference

between CMT, NFL, GCIPL thickness of diabetic patients without or with minimal diabetic retinopathy, compared with normal eyes. Despite this, we found relationship between CMT and inner retinal layers thickness, and diabetes duration.

Оптичната кохерентна томография е прецизен метод, който дава възможност дебелината на ретината и нейните слоеве да бъдат измерени *in vivo*. Повечето проведени в последните години проучвания установяват намаляване на дебелината на слоя на нервните влакна и вътрешния плексиформен слой при пациенти с диабетна ретинопатия, като в някои случаи това се наблюдава при болни с минимални прояви на ДР, което навежда на мисълта, че е възможно невродегенеративните промени да започнат много скоро след началото на диабета (10,11).

Цел и задачи

Целта на настоящото проучване е да се установи причинява ли диабетът промени в централната макулна дебелина (CMT), дебелините на неврофибрилерния слой (NFL) и слоя на ганглийните клетки и вътрешния плексиформен слой (GCIPL) на ретината, при пациенти без или с минимална диабетна ретинопатия. Да се изследва съществува ли връзка между тези промени и продължителността на диабета, и нивото на HbA1c.

Материал и методи

В проучването са включени 85 болни със захарен диабет, като 72% са с втори тип ЗД, а 28% са с първи тип ЗД. Като контрола са използвани данните от 60 очи на здрави доброволци съответстващи по възраст. На всички участници в проучването са изследвани най-добра зрителна острота с корекция (BCVA), преден очен сегмент с биомикроскопия, умерено е вътреочното налягане с апланационна тонометрия, очно дъно е изследвано с

помощта на индиректна офталмобиомикроскопия с +90D леща, след мидриаза.

Изключващи критерии са BCVA по-малка от 1,0, рефракционна грешка по-голяма от 6 диоптъра сфера и/или 3 диоптъра цилиндър, глаукома, мътнини в очните среди, дегенеративни промени в макулата.

Минимална ДР е определена като наличие на 2 или повече микроаневризми и/или малки хеморагии в заден полюс, и липса на такива в периферията на ретината, установени при индиректна офталмобиомикроскопия.

За всички пациенти с диабет са проучени продължителността му, нивата на HgA1c и общия холестерол.

Фиг. 1. (А) скан на макула на ОСТ; (В) снимка на очно дъно; (С) модифицирана ETDRS карта

Участниците в проучването са изследвани с 3D 2000 OCT (Topcon, Japan), като са използвани стандартните протоколи "3D Macula 6.00x6.00mm" и "3D Macula (V) 7.00x7.00mm". При измерването на дебелината на макулата с първия протокол е използвана модифицираната карта на ETDRS, с централно поле 1mm в диаметър и вътрешно, и външно поле съответно с диаметър 3mm и 6mm (фиг. 1). С протокола "3D Macula (V) 7.00x7.00mm" са измерени дебелините на неврофибрилерния слой (NFL), слоя на ганглийните клетки (GCL)+вътрешния плексиформен слой (IPL) (фиг. 2). Всички получени стойности са резултат от автоматичния софтуерен анализ на апарата. Изчис-

Фиг. 2. Разпечатани резултати от 3D Macula V сканиращ протокол.

лени са средните CMT, NFL и GCIPL на 60 очи на диабетици без диабетна ретинопатия и 60 очи с минимална ДР. За обработка на резултатите е използван софтуер SPSS v. 20.0. Приложен е корелационен анализ на Pearson за установяване на зависимости между изследваните параметри. За статистически значими са приети стойности на $p < 0.05$.

Резултати

Средната възраст на пациентите без диабет, с диабет без ДР и с диабет и минимална ДР е съответно $56,6 \pm 13,8$ г., $56,28 \pm 21,15$ г. и $55,18 \pm 11,4$ г. Средната продължителност на диабета е $14,77 \pm 10,43$ години. Средните CMT, NFL и GCIPL в очите без ДР са съответно $210,08 \mu\text{m}$, $34,75 \mu\text{m}$ и $68,55 \mu\text{m}$; в очите с минимална ДР - $214,2 \mu\text{m}$, $35,63 \mu\text{m}$ и $70,83 \mu\text{m}$, и в очите на здравите доброволци $214,73 \mu\text{m}$, $35,53 \mu\text{m}$ и $69,35 \mu\text{m}$. Не се установи статистически значима разлика в дебелините на ретината, съответно CMT, NFL и GCIPL между изследваните групи.

Установи се статистически значима положителна корелация между CMT и продължителността на диабета ($p=0.005$) и статистически значима негативна корелация между дебелината на GCIPL и продължителността на диабета ($p=0.013$), и между NFL+GCIPL и продължителността на диабета ($p=0.04$). Не се установи връзка между CMT, NFL и GCIPL и нивото на HbA1c.

Дискусия

През последните години хипотезата, че диабетната ретинопатия е не само микроангиопатия, а се представя и с невродегенеративни промени в ретината, набира все повече доказателства. Според някои автори дори, ранните прояви на ДР биха могли да се приемат по-скоро за невропатия, отколкото за микроангиопатия. (12) Ганглийните клетки, намиращи се във вътрешните слоеве на ретината, са първите засегнати от апоптозата клетки, което води до изтъняване на неврофибрилерния ѝ слой. Навлизането на

оптичната кохерентна томография в офталмологичната практика дава възможност за *in vivo* измерване на дебелината на различните слоеве на ретината, което разкрива поле за нови изследвания в тази насока.

Настоящото проучване не установи статистически значима разлика между централната дебелина на макулата и дебелините на NFL и GCIPL при изследваните три групи пациенти. За разлика от това, Chhablani J et al. 2015 и Gundogan FC et al. 2016 установяват значимо изтъняване на слоя на нервните влакна при пациенти с втори тип ЗД без ДР, с НПДР и с ПДР (11), и респективно с първи тип ЗД, без ДР (13). Други автори също намират подобни промени, както и намаляване на централната ретинална дебелина (14,15). Съществуват обаче и такива проучвания, които подобно на настоящото, не установяват намаляване на централната макулна дебелина и на ганглийно-клетъчния комплекс при болни с диабет, без или с минимална ДР (9,15,16).

Намерената в настоящото проучване значима негативна корелация между дебелината на GCIPL и продължителността на диабета, и между NFL+GCIPL и продължителността на диабета, все пак поддържа хипотезата за настъпващи в ретината невродегенеративни промени в хода на протичането на заболяването. Подобни на нашите са и резултатите на Gundogan FC et al., които намират значима негативна корелация между продължителността на диабет тип 1 и дебелината на назалната макула, и ганглийно-клетъчния комплекс (13). За разлика от това, в проучването си Chhablani J et al. не установяват такава зависимост при пациенти с втори тип захарен диабет (11).

Настоящото изследване, подобно на тези на Oshitari T et al. (17) и El-Fayoumi D et al. (18) не установи връзка между CMT, NFL и GCIPL и нивото на HbA1c.

Като ограничаващ фактор за настоящото проучване може да се разглежда това, че изследваните пациенти не са раз-

делени според тип на захарния диабет, първи или втори. Разликите в патофизиологията и лечението на двата типа диабет, биха могли да окажат влияние върху развитието както на невродегенеративните промени в ретината, така и на диабетната ретинопатия.

Настоящото проучване, както и тези на редица други автори, показват голямо разнообразие от резултати, които в някои случаи си противоречат. Това обуславя необходимостта от нови, по-обширни изследвания, които биха доказали, че невродегенеративните промени в ретината предхождат развитието на диабетната ретинопатия.

Заклучение

Проведеното изследване не установи статистически значими разлики в СМТ и дебелините на NFL и GCIPL при пациенти с диабет, без или с минимална диабетна ретинопатия, и здрави доброволци. Въпреки това се установи статистически значима негативна връзка между централната дебелина на макулата и дебелината на вътрешните слоеве на ретината, и продължителността на диабета, което е в подкрепа на схващането за настъпващи в ретината невродегенеративни промени в хода на диабета.

Литература

1. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. *Nature* 2001;414:813–820.
2. Barber AJ. A new view of diabetic retinopathy: a neurodegenerative disease of the eye. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2003;27:283–90.
3. Fletcher EL, Phipps JA, Wilkinson-Berka JL. Dysfunction of retinal neurons and glia during diabetes. *Clin Exp Optom* 2005;88:132–45.
4. Lieth E, Gardner TW, Barber AJ, et al. Retinal neurodegeneration: early pathology in diabetes. *Clin Experiment Ophthalmol* 2000; 28: 3–8.
5. Martin PM, Roon P, Van Ells TK, et al. Death of retinal neurons in streptozotocin-induced diabetic mice. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2004; 45: 3330–6.
6. Ning X, Baoyu Q, Yuzhen L, et al. Neuro-optic cell apoptosis and microangiopathy in KKAY mouse retina. *Int J Mol Med* 2004; 13: 87–92.
7. Han Y, Adams AJ, Bearse MA Jr, et al. Multifocal electroretinogram and shortwavelength automated perimetry measures in diabetic eyes with little or no retinopathy. *Arch Ophthalmol* 2004; 122: 1809–15.
8. Klemp K, Sander B, Brockhoff PB, et al. The multifocal electroretinogram in diabetic patients without retinopathy during euglycaemic clamping. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2005; 46: 2620–6.
9. Biallosterski C, Velthoven MEJ, Michels RPJ, Schlingemann RO, DeVries JH, Verbraak FD. Decreased optical coherence tomography measured pericentral retinal thickness in patients with diabetes mellitus type I with minimal diabetic retinopathy. *Br J Ophthalmol*. 2007; 91: 1135–38.
10. Barber AJ, Baccouche B. Neurodegeneration in diabetic retinopathy: Potential for novel therapies. *Vision Res*. 2017 . doi: 10.1016. [Epub ahead of print]
11. Chhablani J, Sharma A, Goud A, Peguda HK, Rao HL, Begum VU, Barteselli G. Neurodegeneration in Type 2 Diabetes: Evidence From Spectral-Domain Optical Coherence Tomography. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2015; 56: 6333–8.
12. Wang NL. Neurodegeneration in Diabetic Retinopathy: Current Concepts and Therapeutic Implications. *Chin Med J* 2016; 129: 3001–3003.

13. Gundogan FC1, Akay F, Uzun S, Yolcu U, Çağıltay E, Toyran S. Early Neurodegeneration of the Inner Retinal Layers in Type 1 Diabetes. *Ophthalmologica* 2016; 235: 125-32.
14. Frydkjaer-Olsen U, Hansen RS, Peto T, Grauslund J. Structural neurodegeneration correlates with early diabetic retinopathy. *Int Ophthalmol*. 2017 Jul 21. doi: 10.1007/s10792-017-0632-1. [Epub ahead of print]
15. Jonsson KB, Frydkjaer-Olsen U, Grauslund J. Vascular Changes and Neurodegeneration in the Early Stages of Diabetic Retinopathy: Which Comes First? *Ophthalmic Res*. 2016; 56:1-9.
16. Srinivasan S, Pritchard N, Sampson GP, Edwards K, Vagenas D, Russell AW2, Malik RA, Efron N. Retinal thickness profile of individuals with diabetes. *Ophthalmic Physiol Opt*. 2016; 36:158-66.
17. Oshitari T., Nonomura S., Arai M., Yamamoto S. Association of OCT parameters with HbA1c level and diabetes duration in early stage of diabetic retinopathy. *Acta Ophthalmologica* 2013; 91: 0
18. El-Fayoumi D, Badr Eldine NM, Esmael AF, Ghalwash D, Soliman HM. Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex Thicknesses Are Reduced in Children With Type 1 Diabetes With No Evidence of Vascular Retinopathy. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2016; 57: 5355-5360.

Адрес за кореспонденция:

доц. д-р З. Златарова, дмн
 Катедра по очни болести и зрителни
 науки, МУ-Варна, СБОБАЛ, Дойран 15,
 Варна
 E-mail: zzlatarova@abv.bg